1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

**Positionsbestimmung des BfS
zu Grundsatzfragen des Strahlenschutzes
(„Leitlinien Strahlenschutz“)**

01.06.2005

1	Inhaltsverzeichnis	
2		
3	Vorwort	
4		
5	A. Ionisierende Strahlung	
6		
7	I. Grundlagen des Strahlenschutzes	
8		
9	A.I.1 Rechtfertigung	4
10	A.I.2 Dosisbegrenzung	8
11	A.I.3 Optimierung	12
12		
13	II. Einzelfragestellungen	
14		
15	A.II.1 Dosis-Wirkungs-Beziehung	16
16	A.II.2 Dosis- und Dosisleistungs-Effektivitätsfaktor (DDREF)	19
17	A.II.3 Gewebe-Wichtungsfaktoren	21
18	A.II.4 Strahlungs-Wichtungsfaktoren (Photonen, Neutronen, Protonen)	24
19	A.II.5 Kollektivdosis	26
20	A.II.6 Verfahren zur Expositionsbestimmung der Bevölkerung	30
21		
22	III. Spezielle Anwendungsgebiete	
23		
24	A.III.1 Freigabe	32
25	A.III.2 Begrenzung der Exposition durch Radon in Gebäuden	35
26	A.III.3 Medizinische Strahlenexposition	37
27		
28		
29	B. Nichtionisierende Strahlung	
30		
31	B.I Rechtfertigung	40
32	B.II Neue Technologien	42
33	B.III Grenzwertsetzung	44
34		
35		
36	C. Schutz von Natur und Umwelt	
37		
38	Entwicklung von Schutzkonzepten für Flora, Fauna und Umweltmedien	46
39		
40		
41	D. Über den reinen Strahlenschutz hinausgehende Fragestellungen	
42		
43	D.I Risikobasierte Bewertungsverfahren	49
44	D.II Vorsorge	54
45		
46		

1 **Vorwort**

2

3 Strahlenschutz geht weit über die Bereiche Technik und Messwesen hinaus, da er Konzepte,
4 ethische Prinzipien und Wertvorstellungen beinhaltet, wie der Schutz von Mensch und Um-
5 welt ausgestaltet werden kann. Ergänzend zum Stand von Wissenschaft und Technik tritt die
6 sich ständig fortentwickelnde gesellschaftliche Diskussion zu Grundsatzfragen des Schutzes
7 von Mensch und Umwelt, zum Leben mit Risiken, zur Beteiligung von Betroffenen und zur
8 Vorsorge. Der Strahlenschutz ist dabei nur eine unter vielen Stimmen. Gerade deswegen ist
9 es sinnvoll und notwendig, von Zeit zu Zeit deutlich zu machen, welche Grundlagen der
10 Strahlenschutz aktuell hat und wo die zukünftigen Herausforderungen liegen. Darüber hinaus
11 gilt es auch, etablierte Positionen zu überprüfen und wenn notwendig zu modifizieren sowie
12 neue Positionen zu beziehen, wenn der Erkenntnisstand dies erfordert.

13

14 Das Bundesamt für Strahlenschutz legt deshalb mit den „Leitlinien Strahlenschutz“ ein Pa-
15 pier vor, in dem es zu 18 grundsätzlichen Fragen des Strahlenschutzes Position bezieht und
16 Anstöße für Diskussionen sowohl mit der Fachwelt als auch mit der interessierten Öffent-
17 lichkeit gibt.

18

19

1 **A. Ionisierende Strahlung**

4 **I. Grundlagen des Strahlenschutzes**

6 Die zentrale fachliche Grundlage des Schutzes gegen die schädliche Wirkung ionisierender
7 Strahlung ist die Annahme einer linearen Dosis-Wirkungsbeziehung ohne Schwelle (LNT-
8 Hypothese). Auf dieser Arbeitshypothese wurde das System des Strahlenschutzes mit den
9 Grundsätzen Rechtfertigung, Minimierung/Optimierung und Dosisbegrenzung aufgebaut.
10 Diese Prinzipien werden im Folgenden erläutert. Dabei werden fallweise unterschiedliche
11 Anwendungen (planbare und genehmigungsbedürftige Tätigkeiten und Arbeiten und die sog.
12 „Interventionen“ (Unfallsituationen, faktische Situationen)) sowie die spezielle Situation in der
13 Medizin betrachtet.

15 **A.I.1 Rechtfertigung**

17 *Hintergrund*

19 Die Anwendung ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe in Wissenschaft und Technik
20 sowie in der Medizin bedarf der Rechtfertigung. Ein wichtiger Aspekt des Rechtfertigungs-
21 prinzipis ist die Abwägung zwischen dem Nutzen der Anwendung und dem Strahlenrisiko.
22 Eine detailliertere Darstellung dieses Sachverhalts ist ICRP 60 zu entnehmen. Erkenntnisse
23 des Strahlenschutzes über die Risiken ionisierender Strahlung fließen zentral in die Rechtfertigungsüberlegungen mit ein. Die Vermeidung von Dosen, wo immer dies von der Anforderung her möglich ist, ist ein wichtiger Aspekt des Rechtfertigungsprozesses und der daraus resultierenden Rechtfertigungsentscheidung. Insbesondere müssen die mit der Anwendung ionisierender Strahlung verbundenen Risiken geringer sein als der Nutzen der Anwendung. Die Abwägung zwischen Risiko und Nutzen erfolgt in den einzelnen Anwendungsfällen in unterschiedlicher Weise wie im Folgenden dargestellt wird.

31 Die Rechtfertigung von Anwendungen ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe im
32 Rahmen planbarer Tätigkeiten setzt eine Abwägung der infolge der Tätigkeit zu erwartenden
33 strahlenbedingten Risiken für den Einzelnen, für Bevölkerungsgruppen oder die Bevölkerung
34 insgesamt und des mit einer solchen Anwendung für den Einzelnen oder die Gesellschaft
35 verbundenen Nutzens voraus. Im Rahmen dieses Abwägungsprozesses sind auch Überlegungen anzustellen, ob das mit einer solchen Anwendung verbundene Ziel auch ohne den Einsatz ionisierender Strahlung bzw. radioaktiver Stoffe erreicht werden kann.

1 Im Falle von Arbeiten, d.h. dem Umgang mit natürlicher Radioaktivität, existieren in vielen
2 Fällen die Strahlenexpositionen bereits, wenn über die Notwendigkeit von Strahlenschutz-
3 maßnahmen entschieden wird. Hier kann es Situationen geben, in denen die Anwendung
4 des Prinzips der Rechtfertigung nur eingeschränkt möglich ist. Wenn sichergestellt ist, dass
5 in solchen Fällen die Aspekte des praktischen Strahlenschutzes Berücksichtigung finden,
6 kann sich die Rechtfertigung primär auf allgemeine gesellschaftliche Diskurse abstützen. In
7 Fällen, in denen die Anwendung des Prinzips der Rechtfertigung entsprechender Maßnah-
8 men möglich ist, muss sich diese an den für Interventionen geltenden Prinzipien orientieren.
9 Allerdings gibt es auch Arbeiten, in denen sich die Vorgehensweise bei der Rechtfertigung
10 an den Prinzipien orientieren sollte, die für Tätigkeiten gelten. Dies trifft z.B. zu für die Ver-
11 wendung von thorierten Elektroden oder von mineralischen Rohstoffen mit möglichst gerin-
12 gem Gehalt natürlicher radioaktiver Stoffe.

13
14 Im Falle von „Interventionen“ ist im Prozess der Rechtfertigung nachzuweisen, dass die In-
15 terventionsmaßnahme oder das Interventionsprogramm mehr Vorteile (Nutzen) als Nachteile
16 (Schaden) verursacht. Unter Nutzen sind in diesem Fall nicht nur die Absenkung von Strah-
17 lenexpositionen, sondern alle positiven Aspekte zu verstehen, die in Folge der Maßnahme
18 oder eines Programms (z.B. des Sanierungsprogramms für bergbauliche Hin-
19 terlassenschaften) erwartet werden. Bei der Bewertung des Schadens (der Nachteile) einer
20 Maßnahme sind nicht nur alle negativen Aspekte, z.B. die Strahlenexpositionen, die Beein-
21 trächtigungen und Belästigungen, die durch die Intervention selbst verursacht werden, zu
22 betrachten, sondern auch die finanziellen Aufwendungen, die für die Durchführung einer
23 Maßnahme oder eines Programms erforderlich sind. Die öffentliche Akzeptanz spielt sowohl
24 bei der Bewertung der positiven als auch der negativen Aspekte eine wichtige Rolle. Für Sa-
25 nierungsprogramme sollten z.B. nach Prüfung aller relevanten Faktoren Maßnahmenwerte in
26 Rechtsvorschriften festgelegt werden, da nur so klare Festlegungen darüber getroffen wer-
27 den, in welchen Fällen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.

28
29 Im Bereich der Medizin müssen zwei Fälle unterschieden werden:

- 30 1. Die Rechtfertigung im Einzelfall, in dem die rechtfertigende Indikation und der Nutzen des
31 einzelnen Patienten im Mittelpunkt stehen.
- 32 2. Die Rechtfertigung im Bereich der Vorsorge im Rahmen von Früherkennungsprogram-
33 men, bei denen der individuelle und der gesellschaftliche Nutzen und das Risiko der in
34 die Früherkennungsprogramme einbezogenen Personen insgesamt abgewogen werden
35 müssen.

36 Eine spezielle Fragestellung ist die Rechtfertigung neuer Techniken und Verfahren in der
37 Medizin unter dem Aspekt des Strahlenschutzes (vgl. A.III.3).

38

1 Sowohl die Ermittlung als auch die Bewertung eines "Nettonutzens" ist nicht trivial und muss
2 zum Teil qualitativ erfolgen. Es sind z.B. alternative Verfahren ohne die Anwendung ionisie-
3 render Strahlung in den Überlegungen zu berücksichtigen. Die Begründung und Quantifizie-
4 rung des Nutzens ist in der Regel nicht originäre Aufgabe des Strahlenschutzes, sondern
5 eine gesellschaftliche Aufgabe, die eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich macht.
6 Dies ist allerdings noch immer nicht allgemein bekannt, geschweige denn akzeptiert, wie die
7 Diskussion im Zusammenhang mit sicherheitsrelevanten Fragestellungen (Zwangsdurch-
8 leuchten von Gütern und Personen an der Grenze) oder andere Anwendungen ionisierender
9 Strahlung ohne medizinische Indikation (Stichwort „medical-legal exposures“) zeigen.

11 *Thesen*

- 13 ▪ Die Rechtfertigung setzt einen aktiven Prozess der Abwägung zwischen Handlungsopti-
14 onen voraus. Der Verweis auf niedrige Expositionen allein ist kein Grund für die Rechtf-
15 fertigung einer Anwendung. Soweit nicht bereits geregelt, muss die Rechtfertigung von
16 neuen Anwendungen ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe grundsätzlich durch
17 eine rechtliche Grundlage geschaffen werden. In Fällen, in denen die Rechtfertigung auf
18 Einzelfallentscheidungen hinausläuft, wie bei der rechtfertigenden Indikation des Arztes,
19 sollte der erforderliche fachliche Abwägungsprozess in Form von anerkannten Standards
20 transparent gemacht werden.
- 21 ▪ Die Rechtfertigung erfolgt in vielen der hier einschlägigen Situationen im Rahmen ge-
22 samt-gesellschaftlicher Prozesse, die den Strahlenschutz mit einbeziehen. Der Prozess
23 der Rechtfertigung muss durch Festschreibung von Standards nachvollziehbar und
24 transparent sein. Dabei müssen die Handelnden und ihre Funktionen eindeutig identifi-
25 ziert, die erwogenen Handlungsoptionen benannt und die jeweils damit verbundenen Ri-
26 siken und der Nutzen aufgezeigt werden. Es ist dringend erforderlich, die Verfahren der
27 Nutzen-Risiko-Abwägung, vergleichbar der Risikobewertung, stärker fachlich-wissen-
28 schaftlich zu basieren. In vielen Fällen können hierbei auch bestehende betriebs-, volks-
29 und versicherungswirtschaftliche sowie gesellschaftswissenschaftliche Methoden zum
30 Einsatz kommen. Die Anwendbarkeit und Übertragbarkeit dieser Methoden für den Ab-
31 gleich von Handlungsoptionen ist weiter zu entwickeln und umzusetzen.
- 32 ▪ Es sind Handlungsanleitungen zu erstellen und verbindlich festzulegen, die die Umset-
33 zung des Rechtfertigungsprozesses sowie der beschriebenen Grundsätze ermöglichen
34 und nachvollziehbar machen.

36 *Begründung*

38 Bis zum heutigen Tag werden Diskussionen zur Rechtfertigung von Tätigkeiten immer wie-
39 der durch Risikoabschätzungen des Strahlenschutzes dominiert mit dem Versuch, die

- 1 Rechtfertigung selbst durch Verweis auf die mit einer Anwendung verbundenen niedrigen
2 Expositionen zu ersetzen. Dies ist grundsätzlich nicht zulässig. So wurden beispielsweise
3 nach den Ereignissen des 11. September in Sicherheitskreisen wiederholt Screening- und
4 Detektionsmethoden ins Gespräch gebracht, für die es bisher keine Rechtfertigung in Form
5 einer Rechtsgrundlage gibt. Den Nachweis des individuellen oder gesellschaftlichen Nutzens
6 können in diesem Fall ausschließlich die für die Sicherheit zuständigen staatlichen Stellen
7 und nicht der Strahlenschutz erbringen. Es ist eine primäre Aufgabe des Staates die rechtli-
8 chen Grundlagen für die Feststellung einer Rechtfertigung zu schaffen.
- 9
- 10 Für die Abwägungsprozesse im Rahmen der Rechtfertigung von Tätigkeiten gibt es derzeit
11 für Betreiber, Anwender und mit Fragen des Strahlenschutzes beauftragte Stellen keine
12 Handlungsanleitungen. Die Festschreibung von Mindeststandards für die operationelle
13 Durchführung der entsprechenden Verfahren in Leitfäden ist dringend notwendig. Die Nach-
14 vollziehbarkeit des Abwägungsprozesses durch Betreiber und Anwender setzt voraus, dass
15 explizit erwogene Handlungsoptionen benannt und die jeweils damit verbundenen Risiken
16 und der Nutzen aufgezeigt werden. Mindestanforderungen an Transparenz und Nachvoll-
17 ziehbarkeit (Dokumentation) sind zu erfüllen.

1 **A.1.2 Dosisbegrenzung**

3 *Hintergrund*

5 Für die Dosisbegrenzung kommen im Strahlenschutz alternativ zwei Vorgehensweisen zum
6 Einsatz. Zum einen wird die Dosis in allen Fällen, in denen die Strahlenquellen im Sinne des
7 Strahlenschutzes kontrolliert, bzw. die Anwendung ionisierender Strahlung und radioaktiver
8 Stoffe geplant werden können, durch Grenzwerte streng begrenzt. Kann die Kontrolle für den
9 Einzelnen im engen Sinne nicht durchgeführt bzw. gewährleistet werden (potentielle Exposi-
10 tionen), so erfolgt die Begrenzung der Dosis aus kontrollierbaren Quellen über Maßnahmen-
11 oder Richtwerte bzw. Ziel- oder Referenzwerte. Diese Werte entfalten im Gegensatz zu ei-
12 nem Grenzwert eine geringere rechtliche Bindungswirkung, und ihnen kommt bezüglich der
13 praktischen Durchführung eine geringere Verbindlichkeit zu.

15 Für beruflich Strahlenexponierte wird die Einhaltung der relevanten Grenzwerte durch ent-
16 sprechende Überwachungsmaßnahmen individuell überprüft und in einem zentralen Register
17 überwacht. Für die allgemeine Bevölkerung beträgt der Grenzwert der effektiven Dosis durch
18 Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten 1 mSv im Kalenderjahr. Die Überwachung dieses
19 Wertes ist weniger exakt möglich als im Falle beruflicher Strahlenexpositionen. Eine indivi-
20 duelle, auf Messwerte gestützte Überwachung ist einerseits nicht möglich, andererseits we-
21 gen der in aller Regel geringen Dosisbeiträge von Strahlenexpositionen aus gegenwärtig
22 ausgeübten Tätigkeiten auch nicht erforderlich. Die Dosisermittlung erfolgt daher durch Ab-
23 schätzverfahren, in die zwangsläufig eine Reihe von Annahmen und Unsicherheiten einge-
24 hen. Die Abschätzung bzw. Berechnung ist nach der StrlSchV so angelegt, dass Expo-
25 sitionen für jede Einzelquelle konservativ abgeschätzt werden, der Dosisbeitrag jeder Einzel-
26 quelle nur einen möglichst geringen Anteil des Grenzwertes ausschöpfen darf und somit ins-
27 gesamt die Abschätzung für Expositionen aus allen Tätigkeiten bezogen auf jede einzelne
28 Person der Bevölkerung als konservativ gelten kann.

30 Für Unfallsituationen sind Eingreifrichtwerte für Sofortmaßnahmen sowie Höchstwerte der
31 Kontamination von Nahrungs- und Futtermitteln festgelegt, die der Dosisbegrenzung über
32 den Ingestionspfad dienen. Die Eingreifrichtwerte erfüllen zwei Zwecke: (i) In der Planungs-
33 phase sind sie Grundlage für organisatorische und sächliche Planungen und Vorhaltungen
34 des Katastrophenschutzes. Sie zielen darauf ab, bei „Gefahr im Verzug“ Sofortmaßnahmen
35 ergreifen und ein Überschreiten der Richtwerte verhindern zu können. (ii) Sollte ein Strah-
36 lenunfall eingetreten sein, so stellen die Eingreifrichtwerte die Obergrenze dar, oberhalb de-
37 rer die Maßnahmen des Strahlenschutzes im Sinne des Katastrophenschutzes zwingend
38 begründet sind.

1 In faktischen Situationen, in denen Strahlenexpositionen auf natürliche Quellen zurück-
2 zuführen sind (z.B. Radon in Aufenthaltsräumen) oder Hinterlassenschaften früherer
3 menschlicher Tätigkeiten darstellen (z.B. Altlasten), dienen Maßnahmen- und Zielwerte ei-
4 nerseits zur Begründung von Sanierungsmaßnahmen bzw. geben andererseits das Ziel der
5 Dosisreduktion vor, das durch die Maßnahmen mindestens erreicht werden sollte. Sollten
6 Expositionen oberhalb von Maßnahmenwerten liegen, sind Sanierungsmaßnahmen unter
7 Beachtung des Optimierungsgrundsatzes des Strahlenschutzes so zu planen und auszufüh-
8 ren, dass ein Unterschreiten des Zielwertes möglichst erreicht wird. Eine Unterschreitung
9 besagt nicht notwendigerweise, dass der Optimierungsprozess im Sinne des Strahlenschut-
10 zes automatisch abgebrochen werden kann. Umgekehrt heißt dies aber auch, dass ein
11 nachweisbar optimiertes Ergebnis oberhalb des Zielwertes im Sinne des Strahlenschutzes
12 akzeptiert werden muss.

13
14 Die Begrenzung der Strahlenexposition in der medizinischen Diagnostik erfolgt mit Hilfe Dia-
15 gnostischer Referenzwerte (DRW). Ein wiederholtes Überschreiten der Referenzwerte durch
16 Betreiber oder Anwender hat eine Überprüfung der technischen Einrichtungen durch die zu-
17 ständigen Stellen zur Folge. Das Ziel ist, die Gründe für die Überschreitung zu ermitteln und
18 eine Reduzierung auf die für das diagnostische Verfahren mindestens notwendige Expositi-
19 onshöhe unterhalb der DRW zu erreichen. Neben diesem physikalisch-technischen Bereich
20 ist eine Verbesserung der Qualität der Untersuchungen durch Weiterbildungen und die An-
21 wendung des Standes der medizinischen Wissenschaften anzustreben. Wesentliche Be-
22 deutung zur Dosisreduktion kommt bei diagnostischen Verfahren in der Medizin der rechtfert-
23 igenden Indikation zu. Für therapeutische Anwendungen sind in Übereinstimmung mit der
24 ICRP keine Dosisbegrenzungen festgelegt; hier gilt das individuelle Rechtfertigungsprinzip.

25
26 Das Einhalten der für die unterschiedlichen Situationen relevanten Begrenzungswerte und
27 -prinzipien allein reicht im Strahlenschutz nicht aus. Es besteht vielmehr immer das zusätzli-
28 che Erfordernis zur Optimierung (vgl. A.I.3).

29
30 *Thesen*

- 31
- 32 ▪ Bei kontrollierbaren Strahlenquellen und planbaren Strahlenanwendungen stellen Dosis-
33 grenzwerte ein wesentliches Element des Strahlenschutzes dar.
 - 34 ▪ Bei beruflich strahlenexponierten Personen sind Strahlenexpositionen auf der Basis indi-
35 vidueller Dosismesswerte zu erfassen und zu bewerten. Strahlenexpositionen aus Tätig-
36 keiten und Arbeiten sind gleich zu bewerten; sollten Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten
37 und Arbeiten vorliegen, so ist die Summe der Expositionen zu bewerten. Die Dosis-
38 messwerte sind zentral zu erfassen und die Grenzwerte zentral zu überwachen.

- 1 ▪ Bei der Bevölkerung sind Strahlenexpositionen aus Tätigkeiten abzuschätzen bzw. zu
2 berechnen. Eine messtechnische Überwachung auf individueller Ebene ist weder möglich
3 noch notwendig. Die Überwachung der Dosisbegrenzung der Bevölkerung muss auf hin-
4 reichend abdeckenden Abschätz- und Berechnungsverfahren beruhen. Eine bestimmte
5 Strahlenquelle oder Strahlenanwendung darf dabei nur einen möglichst kleinen Anteil
6 des Dosiswertes, der durch den Dosisgrenzwert vorgegeben ist, ausschöpfen. Diese
7 Einschränkung gilt auch für einzelne Ableitungspfade.
- 8 ▪ Zur Begrenzung der Dosis aus diagnostischen Anwendungen in der Medizin kommen
9 Diagnostische Referenzwerte zur Anwendung. Die Unterschreitung ist durch physika-
10 lisch-technische und durch Verfahren der Qualitätssicherung zu gewährleisten.
- 11 ▪ Erfolgen die Strahlenexpositionen durch Quellen, die nicht kontrollierbar sind, so erfolgt
12 die Dosisbegrenzung durch Maßnahmen- und Zielwerte. Expositionen oberhalb des
13 Maßnahmenwertes bedingen die Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Dosisre-
14 duktion unter Einhaltung der Grundsätze der Optimierung. Ziel der Maßnahmen ist eine
15 Unterschreitung relevanter Zielwerte. Ein Beispiel hierfür ist die vom BfS aktiv verfolgte
16 Regelung zur Dosisbegrenzung durch Radon in Aufenthaltsräumen (vgl.A.III.2).
- 17 ▪ Bei Unfallsituationen wird die Dosis durch Eingreifrichtwerte begrenzt. Diese dienen ei-
18 nerseits der Planung von Maßnahmen des Katastrophenschutzes und stellen andererseits
19 die Obergrenzen dar, die die Durchführung dieser Maßnahmen in einer Unfallsituation
20 zwingend im Sinne des Katastrophenschutzes begründen.
- 21 ▪ Die Dosisbegrenzung durch Dosisgrenzwerte oder durch Maßnahmen- und Zielwerte
22 muss immer ergänzt werden durch die Anwendung des Optimierungsgrundsatzes des
23 Strahlenschutzes.

24

25 *Begründung*

26

27 Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zeigt, dass mit der Durchsetzung des Prinzips der
28 Dosisbegrenzung und der Optimierung die Expositionen im Bereich der beruflich Strah-
29 lenexponierten kontinuierlich abgenommen haben. Die Reduzierung des Grenzwertes auf
30 20 mSv pro Jahr hat zu keinen erkennbaren betriebsbedingten Schwierigkeiten geführt. Die
31 Überwachungsdaten des Strahlenschutzregisters zeigen vielmehr, dass bereits vor der ent-
32 sprechenden rechtlichen Festlegung die Häufigkeit von Dosiswerten am oberen Ende der
33 Dosisverteilung (> 20 mSv/Jahr) abgenommen hat.

34

35 Im Gegensatz zur Dosisbegrenzung beruflich strahlenexponierter Personen, die sich grund-
36 sätzlich auf die messtechnische Erfassung personenbezogener Expositionen stützt, ist dies
37 bei der Bevölkerung nicht möglich. Solange Expositionen aus einzelnen Quellen oder An-
38 wendungen abdeckend geschätzt bzw. berechnet wurden und nur einen kleinen Anteil des

- 1 Dosiswertes ausmachen, der insgesamt durch die Dosisbegrenzung vorgegeben wird, ist
2 diese Notwendigkeit nicht gegeben. Sollte jedoch eine Quelle oder eine Anwendung einen
3 Großteil des durch den Grenzwertes vorgegeben Dosiswertes ausschöpfen, z.B. in de-facto
4 Situationen, würde sich die Frage der Notwendigkeit neu stellen.
5
- 6 In Situationen, in den Expositionen faktisch vorliegen, ist eine Dosisbegrenzung nach dem
7 Grenzwertprinzip praktisch nicht sinnvoll. Vielmehr ist der Betrachtung solcher Einzelsituati-
8 onen unter Beachtung des Grundsatzes der Optimierung die Methode der Wahl. In solchen
9 Situationen wird das Prinzip der Dosisbegrenzung am wirksamsten durch Maßnahmenwerte,
10 die den Start eines Optimierungsverfahrens zwingend begründen und Zielwerte, die eine
11 Mindestanforderung an die Maßnahmen definieren, umgesetzt. Dieses Verfahren trifft u.a.
12 auf Radon in Aufenthaltsräumen und auf radiologische Altlasten zu (vgl. A.III.2 und A.III.1).
13
- 14 Interventionssituationen können grundsätzlich wie Situationen mit faktisch vorliegenden Ex-
15 positionen betrachtet werden. Hier begründen Eingreifrichtwerte die Obergrenze, oberhalb
16 derer Maßnahmen zwingend begründet sind.

1 A.I.3 Optimierung

3 *Hintergrund*

5 Das Prinzip der „Optimierung“ hat eine erhebliche Bedeutung für den praktischen Strahlen-
6 schutz. Nach ICRP 60 gilt: “In relation to any particular source within a practice, the magni-
7 tude of individual doses, the number of people exposed, and the likelihood of incurring expo-
8 sures where these are not certain to be received should all be kept **as low as reasonably**
9 **achievable**, economic and social factors being taken into account”. Dieses „ALARA“-Prinzip
10 ist dem in der StrlSchV verankerten Minimierungsgebot (“... jede Strahlenexposition ... unter
11 Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik und unter Berücksichtigung aller
12 Umstände des Einzelfalles auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu halten”)
13 gleichwertig. Bei der praktischen Anwendung des Optimierungsprinzips im Rahmen plane-
14 rischer Überlegungen sind Strategien zu erarbeiten und anzuwenden, die unter Berücksichti-
15 gung der Umstände des Einzelfalles zur Reduktion der Exposition der Bevölkerung und be-
16 ruflich Strahlenexponierter führen. Hierbei ist die Dosisermittlung möglichst realistisch durch-
17 zuführen. Es werden insbesondere die Höhe der individuellen Exposition und die Zahl der
18 Exponierten betrachtet. Bei Optimierungsüberlegungen wird u.U. auch die Kollektivdosis als
19 ergänzender Bewertungsmaßstab mit berücksichtigt. Die konsequente Anwendung dieses
20 Prinzips führt auch zu Überlegungen und Maßnahmen, die zur Reduktion von Unfallrisiken
21 und potentiellen Expositionen beitragen. Bei der Anwendung des Prinzips werden sowohl
22 strahlenhygienische und technische als auch ökonomische und soziale Fragestellungen be-
23 rücksichtigt.

25 In Situationen, in denen technische Anlagen bzw. Anwendungen ionisierender Strahlung und
26 radioaktiver Stoffe planbar sind, fließen die Ergebnisse von Optimierungsüberlegungen in
27 Richtlinien, Standards, Verwaltungsvorschriften etc. ein. Diese werden nach dem Stand von
28 Wissenschaft und Technik ständig weiter entwickelt und im Einzelfall dann in konkrete tech-
29 nische Maßnahmen umgesetzt. Während des Betriebs und des Rückbaus solcher Anlagen
30 sind dauerhaft entsprechende Optimierungsmaßnahmen erforderlich.

32 In „Interventionssituationen“ besteht eine enge Wechselwirkung zwischen der Rechtfertigung
33 und der Optimierung. Während im Prozess der Rechtfertigung grundsätzlich nachzuweisen
34 ist, dass Interventionsmaßnahmen einen Netto-Nutzen ergeben können, sind im Prozess der
35 Optimierung aus den möglichen Maßnahmen jene auszuwählen, die den maximalen Nutzen
36 ergeben. Dieses Prinzip wird im Falle von Sanierungsprogrammen dadurch berücksichtigt,
37 dass bei der Festlegung eines Maßnahmenwerts bereits eine Abwägung von Nutzen und
38 Schaden (Vor- und Nachteilen) vorgenommen wird (vgl. A.I.1). Maßnahmen der Optimierung
39 beschränken sich darauf, aus den möglichen Maßnahmen jene auszuwählen, die im Einzel-

1 fall zu einer dauerhaften Unterschreitung des Maßnahmenwertes führen und von den Betei-
2 ligten akzeptiert werden.

3
4 Die internationale Diskussion ist sich darin einig, dass der Optimierungsprozess nicht durch
5 eine vorab getroffene Festlegung generischer Werte im Sinne einer Abschneidevorschrift
6 begrenzt werden kann. Der Optimierungsprozess soll vielmehr dann beendet werden, wenn
7 im Rahmen des Gesamtprozesses das Optimum erreicht ist. Es besteht allerdings auch Ü-
8 bereinstimmung in der Auffassung, dass bei der Festlegung des Optimums auch Aufwände
9 für jeweils weitere Optimierungsschritte betrachtet werden müssen und dass der Aufwand
10 bei sehr niedrigen Expositionen „angemessen“, d.h. entsprechend niedrig sein muss. Es
11 kann hierbei hilfreich sein, im unteren Bereich des Optimierungsraums ein Dosisziel oder
12 Risikoziel festzulegen, das die Größenordnung der Optimierungsnotwendigkeit aus Sicht des
13 Gesetz- oder Verordnungsgebers vorgibt.

14 Eine allgemein anwendbare Methode zur praktischen Durchführung der Optimierung kann
15 wegen der vielfältigen Faktoren, die im Optimierungsprozess zu betrachten sind, nicht ange-
16 geben werden. Eine ausschließliche Anwendung der quantitativen (mathematischen) Kos-
17 ten-Nutzen-Analyse ist abzulehnen, da sie den Optimierungsprozess auf Fragen der Monet-
18 arisierung radiologischer Risiken reduzieren würde. Soll die Kollektivdosis im Rahmen der
19 Optimierung bewertet werden, ist sorgfältig zu prüfen, ob die Voraussetzungen dafür gege-
20 ben sind. Hierbei ist einer parameterbasierten Betrachtung der Verteilung der Individualdo-
21 sen der Vorzug zu geben. Dies gilt insbesondere zur Abschätzung des Risikos bei großen
22 Kollektiven mit kleinen individuellen Dosisbeiträgen. In einem solchen Fall ist die Verwen-
23 dung der Kollektivdosis als Maßstab für die Optimierung grundsätzlich nicht geeignet. Bei der
24 Optimierung von Sanierungsmaßnahmen für bergbauliche und industrielle Hinterlassen-
25 schaften, bei denen der Hauptbeitrag zur Kollektivdosis durch Individualdosen im natürlichen
26 Bereich zustande kommt, gilt dies in besonderem Maße. Grund dafür ist, dass die so be-
27 rechneten Kollektivdosen häufig als alleinige Basis zur Berechnung strahleninduzierter To-
28 desfälle genommen werden, die danach mit mehr oder weniger willkürlichen Annahmen in
29 monetäre Kosten umgerechnet werden. Eine Entscheidung zwischen verschiedenen Sanie-
30 rungsoptionen müsste dann auf der Basis eines Vergleichs der derart aus der Kollektivdosis
31 abgeleiteten monetären Folgen getroffen werden. Dies ist nicht sinnvoll.

32
33 Trotz der zahlreichen fachlichen Probleme, die nach wie vor mit der praktischen Umsetzung
34 des Optimierungsgrundsatzes verbunden sind, muss dieses Grundprinzip eine zentrale
35 Stellung im praktischen Strahlenschutz bekommen, da nur die konsequente Anwendung des
36 Prinzips der Optimierung zur Etablierung einer Sicherheitskultur führt, in der sich die für die
37 Belange des Strahlenschutzes Verantwortlichen und die Betroffenen gemeinsam um die Re-
38 duktion der Strahlenexpositionen bemühen. Die Einbeziehung der Betroffenen („stakeholder
39 involvement“) ist ein wesentlicher Aspekt dieser Sicherheitskultur. Der Prozess des stake-

holder involvement kann und muss je nach Fragestellung sehr unterschiedlich gestaltet werden und setzt bei den Verantwortlichen ein hohes Maß an Management- und sozialer Kompetenz voraus. Richtig eingesetzt führt diese Form der Beteiligung an der Vorbereitung von Entscheidungen aber zu einer Verbesserung von Entscheidungen, zu einer Vergrößerung der Transparenz der zugrunde liegenden Prozesse und letztlich zu einer Festigung der Vertrauensbasis.

Thesen

- Optimierung setzt einen aktiven Prozess der Abwägung zwischen Handlungsoptionen voraus. Das Erreichen niedriger Expositionswerte unterhalb von Grenz- und Richtwerten oder das Unterschreiten eines bestimmten Verhältnisses von Aufwand (Kosten) zu Ertrag (eingesparte Dosis) allein ist noch kein Nachweis dafür, dass das Optimum einer bestimmten Anwendung erreicht ist. Frühere Vorgehensweisen dieser Art haben sich als dem Problem nicht angemessen erwiesen. Es ist Aufgabe des „Betreibers“ bzw. Antragstellers und Genehmigungsinhabers, Optimierungsüberlegungen anzustellen, transparent zu gestalten und zu dokumentieren. Es ist Aufgabe der Behörde, diese Überlegungen zu prüfen und in der Genehmigung zu dokumentieren, dass dem Optimierungserfordernis Rechnung getragen wurde. Zur Umsetzung dieser Anforderung sind Handlungsanleitungen zu erstellen und verbindlich einzuführen. Dieses Prinzip gilt analog auch für den Bereich der Anwendung ionisierender Strahlung und radioaktiver Stoffe in der Medizin.
- Wie bei der Rechtfertigung sind bei der Optimierung neben den fachlichen und technischen Fragen des Strahlenschutzes auch soziale und gesellschaftliche Prozesse wichtig; der Prozess der Optimierung muss durch Festschreibung von Mindeststandards nachvollziehbar und transparent sein. Die Festschreibung solcher Standards in Leitfäden ist dringend notwendig. Die Leitfäden müssen folgende Aspekte berücksichtigen: Definition von Zielhierarchien, Aufzeigen von Alternativen, Präferenzen/Prioritäten und Beschreibung des eigentlichen Verfahrens.
- Im Rahmen verbindlicher Regelungen müssen die Notwendigkeit zur Ausgestaltung des Optimierungsprozesses und Bedingungen für die Durchführung des Prozesses einschließlich der Einbeziehung der Betroffenen („stakeholder involvement“) festgelegt sein.
- Zur sachgerechten Umsetzung des Stakeholder-Prozesses müssen sowohl das fachliche Anforderungsprofil der im Strahlenschutz Verantwortlichen als auch die Organisationsformen der Strahlenschutzorganisationen und -behörden weiter entwickelt werden.

1 *Begründung*

2

3 Bis zum heutigen Tag werden Diskussionen zur Anwendung des Prinzips der Optimierung
4 immer wieder durch Verweis auf damit verbundene niedrige Expositionen ersetzt. Dies ist
5 nicht zulässig. Die o.a. Rollen von Betreiber und Behörde sind derzeit nicht in der erforderli-
6 chen Klarheit beschrieben. Aus Gründen der Transparenz und der Nachprüfbarkeit ist dies
7 erforderlich.

8

9 Für die Abwägungsprozesse im Rahmen der Optimierung gibt es derzeit keine Handlungs-
10 anleitung für Betreiber, Anwender und mit Fragen des Strahlenschutzes beauftragte Stellen,
11 die Mindeststandards für eine operationelle Umsetzung des Grundprinzips der Optimierung
12 festlegen und die Überprüfung der erfolgreichen Anwendung des Optimierungsprinzips er-
13 möglichen. Die Nachvollziehbarkeit des Abwägungsprozesses durch Betreiber und Anwen-
14 der setzt voraus, dass explizit erwogene Handlungsoptionen benannt und jeweils damit ver-
15 bundene Risiken und Nutzen aufgezeigt werden. Mindestanforderungen an Transparenz und
16 Dokumentation sind zu erfüllen.

17

18 Entsprechende Regelungen zur Ausgestaltung des Optimierungsprozesses und Bedingun-
19 gen für die Durchführung des Prozesses einschließlich der Einbeziehung der Betroffenen
20 (stakeholder involvement) liegen bisher noch nicht für alle wichtigen Anwendungsfälle vor.

21

22 Das Ausbildungsprofil der Verantwortlichen im Strahlenschutz ist derzeit in hohem Maße von
23 fachlicher Qualifikation in den einschlägigen Fachrichtungen von Naturwissenschaft und
24 Technik geprägt. Angebote zur Fort- und Weiterbildung auf den hier einschlägigen Fächern
25 der Sozialwissenschaften sind dagegen eher selten. Mitarbeiter/-innen in bestehenden
26 Strahlenschutzorganisationen und -behörden, die über das gesamte Kompetenzspektrum
27 verfügen, stellen derzeit eher eine Minderheit dar. Die derzeitigen Organisationsformen der
28 mit Strahlenschutzfragen befassten Institutionen sind noch nicht in allen Fällen auf die prak-
29 tische Umsetzung von beteiligungsorientierten Stakeholder-Prozessen eingerichtet.

1 II. Einzelfragestellungen

2 3 A.II.1 Dosis-Wirkungs-Beziehung

4 5 *Hintergrund*

6
7 Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Strahlenwirkungen und Strahlenrisiko stützen sich
8 auf epidemiologische, strahlenbiologische und tierexperimentelle Studien. Die Quantifizie-
9 rung des Strahlenrisikos beruht auf in sich vergleichbaren epidemiologischen Studien bei
10 Personengruppen, die verschiedenen hohen Strahlenexpositionen ausgesetzt waren, so dass
11 unterschiedlich hohe Krebs- oder Leukämiehäufigkeiten in Abhängigkeit von der Dosis bzw.
12 Exposition festgestellt werden konnten. Dazu gehören insbesondere die Überlebenden der
13 Atombomben-Explosionen, die aus medizinischen Gründen bestrahlten Patienten (z.B. mit
14 Morbus Bechterew, Tuberkulose, Mastitis, Tinea capitis) und die beruflich strahlenexponier-
15 ten Personen (Uranbergarbeiter, Leuchtziffermalerinnen, Beschäftigte in kerntechnischen
16 Anlagen).

17
18 Die epidemiologischen Studien bei den Atombomben-Überlebenden von Hiroshima und Na-
19 gasaki, die nach Dauer und Personenzahl zu den umfangreichsten Studien gehören, zeigen
20 für alle Krebsarten zusammengenommen eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung vom nied-
21 rigen Dosisbereich, d.h. von etwa 50 mSv bis zu einer Dosis von etwa 3 Sv. Die Dosis-
22 Wirkungs-Beziehung für Leukämien wird am besten durch eine linear-quadratische Funktion
23 beschrieben, ist aber besonders im niedrigen Dosisbereich mit einer linearen Funktion ver-
24 einbar. Für viele Krebsarten ist die Zahl beobachteter strahlenbedingter Krebsfälle für eine
25 Bestimmung organspezifischer Dosis-Wirkungs-Beziehungen in aller Regel zu klein. Statis-
26 tisch signifikante Krebsrisiken wurden aufgrund der Größe der Studienpopulationen bei Ex-
27 positionen über 50 mSv effektive Dosis beobachtet. Andere epidemiologische Studien als die
28 bei den Atombomben-Überlebenden weisen darauf hin, dass auch bei Expositionen unter-
29 halb von 50 mSv erhöhte Strahlenrisiken auftreten. In der Oxford-Studie, bei der u.a. Krebs-
30 risiken von Kindern untersucht wurden, die während der Schwangerschaft einer erhöhten
31 Strahlenexposition durch Röntgenstrahlung ausgesetzt waren, konnte eine untere Nach-
32 weisgrenze für ein statistisch signifikant erhöhtes Strahlenrisiko von 10 mSv effektive Dosis
33 beschrieben werden. In den sog. Indoor-Radonstudien, in denen das Lungenkrebsrisiko
34 durch Radon in Wohnräumen untersucht wurde, zeigt sich, dass eine lineare Expositions-
35 Wirkungsbeziehung mit den Daten am besten vereinbar ist. Mit steigender Radonkonzentra-
36 tion wurde ein statistisch signifikanter Anstieg des Lungenkrebsrisikos nachgewiesen. Dabei
37 wurde als Exposition der zeitgewichtete Mittelwert der Radonkonzentrationen der in den
38 letzten 5 bis 35 Jahren bewohnten Wohnungen berücksichtigt. Weiterhin konnte als untere
39 Nachweisgrenze der statistischen Signifikanz eine Radon-Aktivitätskonzentration von etwa
40 100 Bq/m³ gezeigt werden. Diese Radonkonzentration in Wohnräumen entspricht einer jähr-
41 lichen effektiven Dosis von etwa 2 mSv und bezogen auf 30 Expositionsjahre etwa 60 mSv.

1 Für Dosen unterhalb der genannten Nachweisgrenzen, die einer epidemiologischen Risiko-
2 analyse aus methodischen Gründen in der Regel nicht mehr weiter zugänglich sind, werden
3 biophysikalische und strahlenbiologische Erkenntnisse zur Ableitung der Dosis-Wirkungs-
4 Beziehung herangezogen. Da eine einzelne Energiedeposition durch die Strahlung in einer
5 Zelle (bei 10 mSv Röntgenstrahlung wird eine einzelne Zelle in der Regel von einer einzigen
6 physikalischen Elektronenspur getroffen) zur Krebsauslösung ausreicht und zelluläre Repa-
7 raturprozesse nicht immer vollkommen sind, wird für die Zwecke des praktischen Strahlen-
8 schutzes auch im Dosisbereich unterhalb von 10 mSv eine lineare Dosis-Wirkungs-
9 Beziehung angenommen. Auch bei kleineren Dosen ist das minimale Expositionereignis
10 immer das einer singulären Elektronenspur, nur werden dann einfach relativ weniger einzel-
11 ne Zellen eines Organismus getroffen. Da Krebserkrankungen in der Regel monoklonale
12 Ereignisse sind, d.h. von einer einzelnen geschädigten Zelle ausgehen, ist die lineare Dosis-
13 Wirkungs-Beziehung auch bei Expositionen, die durch singuläre Elektronenspuren in einzel-
14 nen Zellen charakterisiert sind, d.h. Dosen unterhalb von 10 mSv, die fachlich begründete
15 Annahme.

16
17 Für vererbare genetische Veränderungen muss aufgrund des gleichen Wirkmechanismus
18 ebenfalls eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung angenommen werden. Da hierfür keine
19 direkten Beobachtungen beim Menschen vorliegen, stützt sich diese Annahme weitestge-
20 hend auf tier- und laborexperimentelle Erkenntnisse.

21 22 *Thesen*

- 23
24 ▪ Für die Auslösung stochastischer Strahlenwirkungen (Krebs, Leukämien, genetische
25 Schäden) muss im Bereich kleiner Dosen von einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung
26 ohne Schwellendosis ausgegangen werden. Für den niedrigen bis mittleren Dosisbereich
27 zwischen etwa 10 und 200 mSv effektive Dosis wurde dies in der überwiegenden Zahl
28 der relevanten epidemiologischen Studien und für die überwiegende Zahl der Krebsarten
29 bestätigt. Auch für den Dosisbereich unterhalb von 10 mSv ist diese Annahme, basierend
30 auf biophysikalischen Modellen zum Wirkmechanismus, plausibel. Sie ist darüber hinaus
31 auch bezüglich der Praktikabilität im Strahlenschutz sinnvoll.
- 32 ▪ Die lineare Extrapolation schätzt das Strahlenrisiko auch im niedrigen Dosisbereich rea-
33 listisch ab. In der Zusammenschau betrachtet ist eine lineare Abschätzung des Gesamt-
34 risikos durch Strahlung im Bereich kleiner Dosen weder über- noch unterschätzend. Es
35 gibt zwar Einzelbefunde, die ein Abweichen von der Linearität im niedrigen Dosisbereich
36 nach oben bzw. unten möglich erscheinen lassen, insgesamt betrachtet überwiegt aber
37 die Evidenz für einen linearen Zusammenhang zwischen Exposition und Risiko auch bei
38 niedrigen Expositionen. Im Gegensatz zur häufig in populärwissenschaftlichen Stellung-
39 nahmen unterstellten Behauptung ist die lineare Abschätzung im Bereich kleiner Dosen
40 nicht notwendigerweise konservativ.

- 1 ▪ Betrachtet man hingegen einzelne Krebsarten, so kann der auf der Basis der linearen
2 Extrapolation für das gesamte Strahlenrisiko abgeschätzte Risikowert zu einer Über-
3 erschätzung des Risikos für eine einzelne Krebsart, für eine andere aber zu einer Unter-
4 erschätzung führen. Auch für jede einzelne Krebsart ist die lineare Extrapolation, von weni-
5 gen Ausnahmen (Osteosarkome nach Inkorporation von α -Strahlern, Leukämien im mitt-
6 leren bis hohen Dosisbereich) abgesehen, unter Berücksichtigung bestehender Unsi-
7 cherheiten das beste Abschätzverfahren für den niedrigen Dosisbereich.

8
9 *Begründung*

10
11 Auf der Grundlage der vorhandenen Erkenntnisse beschreibt keine andere als die lineare
12 Dosis-Wirkungs-Beziehung die beobachteten Strahlenwirkungen mit größerer Plausibilität.
13 Zwar gibt es Hinweise aus Einzelbeobachtungen, dass durch die lineare Beziehung das
14 Strahlenrisiko im Einzelfall unterschätzt oder überschätzt werden kann, aber in ihrer Zusam-
15 menschau kommt diesen Einzelbeobachtungen keine ausreichende Evidenz zu, um ein
16 grundsätzliches Abweichen von der Annahme einer linearen Dosis-Wirkungsbeziehung zu
17 rechtfertigen. Das häufig in diesem Zusammenhang angeführte Argument, dass bei niedri-
18 gen und protrahierten Expositionen, die in der Regel bei den heutigen regulationsrelevanten
19 Strahlenexpositionen vorliegen, von einer unterlinearen Dosis-Wirkungsbeziehung auszuge-
20 hen ist, das letztendlich zur Einführung des DDREF in den ICRP-Empfehlungen geführt hat,
21 muss auf der Basis der erneuten Bewertung einschlägig aussagefähiger epidemiologischer
22 Untersuchungen zurückgewiesen werden. Der in tier- und laborexperimentellen Studien z.T.
23 beobachtete unterlineare Effekt bei niedrigen und protrahierten Dosen kann aus Beobach-
24 tungsstudien beim Menschen nicht nur nicht bestätigt werden, vielmehr ergeben diese Un-
25 tersuchungen keinen Hinweis auf einen DDREF (siehe hierzu Abschnitt A.II.2). Für Fragen
26 des Strahlenschutzes muss daher für den gesamten regulationsrelevanten, d.h. auch niedri-
27 gen Dosisbereich von einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Schwellendosis aus-
28 gegangen werden. Die Charakterisierung des Abschätzverfahrens für den Bereich kleiner
29 Dosen als konservativ ist fachlich unbegründet. Unter Beachtung der Datenunsicherheiten
30 kann das derzeit angewandte Abschätzverfahren zu einer Über- bzw. Unterschätzung des
31 wirklichen Risikos um etwa den Faktor 2 führen. Ein konservatives Abschätzverfahren würde
32 diese Abschätzunsicherheit berücksichtigen und daher von um den Faktor 2 höheren Risiken
33 ausgehen (siehe hierzu auch A.II.2).

34
35 Auch Gründe der Praktikabilität sprechen für eine Anwendung der linearen Abschätzung im
36 praktischen Strahlenschutz. Bei allen anderen Modellen ist eine einfache Addition von Expo-
37 sitionen, wie sie u.a. bei den für beruflich strahlenexponierte Personen zu berücksichtigen-
38 den Dosen oder bei der Berücksichtigung der Expositionen durch die natürliche Strahlung
39 notwendig ist, nicht möglich.

A.II.2 Dosis- und Dosisleistungs-Effektivitätsfaktor (DDREF)

Hintergrund

In der ICRP-Empfehlung Nr. 60 (1991) wurde ein Dosis- und Dosisleistungs-Effektivitätsfaktor (DDREF) für Strahlungen mit niedrigem LET in Höhe von 2 eingeführt. Dadurch halbiert sich der beste Schätzwert für das Strahlenrisiko, wie er aus den Daten der japanischen Atombomben-Überlebenden abgeschätzt wird. Der DDREF von 2 wird damit begründet, dass experimentelle Ergebnisse durch Tierversuche und einige begrenzte Erfahrungen am Menschen nahe gelegt haben, dass die Krebsinduktion bei niedrigen Dosen und Dosisleistungen geringer sei als bei hohen Dosen und Dosisleistungen. Die vorliegenden epidemiologischen Beobachtungen sind dagegen in aller Regel mit einer linearen Dosis-Wirkungsbeziehung vereinbar, d.h. mit einem DDREF von 1. Eine erneute Gegenüberstellung und Bewertung der Ergebnisse einschlägiger epidemiologischer Studien mit einerseits akuten und andererseits protrahierten, chronischen Expositionen ergibt keinen Hinweis auf das Vorliegen eines DDREF.

Thesen

- Für die Anwendung eines Dosis- und Dosisleistungs-Effektivitätsfaktor (DDREF) fehlt die ausreichende wissenschaftliche Begründung.
- Der in den Risikoabschätzungen und den Empfehlungen der ICRP, die Grundlage der zur Zeit geltenden rechtlichen Regelungen sind, enthaltene DDREF von 2 für locker ionisierende Strahlung, führt zu einer entsprechenden Unterschätzung des Strahlenrisikos für locker ionisierende Strahlung im niedrigen Dosisbereich und bei chronischer Strahlenexposition. Er sollte daher nicht weiter verwendet werden.

Begründung

Es gibt keine ausreichende epidemiologische Begründung für einen DDREF von 2 (z.B. Vergleich NRPB-Studie bei beruflich strahlenexponierten Person und Studien bei Atombomben-Überlebenden). Die Begründung für einen DDREF von 2 stützt sich nahezu ausschließlich auf Befunde aus Zellkultur- und Tierversuchen. Der Vertrauensbereich der Risikoabschätzungen aus den epidemiologischen Studien bei den Atombomben-Überlebenden ist von der Größenordnung, dass die wahren Risikoschätzer um den Faktor 2 höher oder niedriger liegen könnten, d.h. einen DDREF von 2 mit einschließen. Die Einführung eines DDREF von 2 nutzt somit für einen einzelnen Faktor den Vertrauensbereich des Risikos nach einer Seite vollständig aus und lässt für andere Einflussfaktoren, die in gleicher Richtung wirken könnten, keinen Teil der Varianz mehr frei. Die Ausnutzung des gesamten Varianzraums in eine

1 Richtung durch einen Faktor ist wissenschaftlich nicht plausibel, wenn begründet angenom-
2 men werden muss, dass weitere Faktoren die Varianz bedingen und deren Richtung nicht
3 eindeutig bestimmt ist.

4 In der ICRP 60 wurde eine Berücksichtigung der höheren RBW (relativen biologischen Wirk-
5 samkeit) von Röntgenstrahlung niedriger Energien gegenüber Gamma-Strahlung mit der
6 Begründung abgelehnt, dass ein Unterschied in Höhe eines Faktors 2 unter Berücksichtigung
7 der Schwankungsbreite der Risikoabschätzungen durch epidemiologische Befunde keinen
8 anderen Strahlungs-Wichtungsfaktor begründen könne. Damit wird unter Heranziehung des
9 gleichen Arguments einmal die Einführung eines Faktors von 2 für den DDREF begründet,
10 für die RBW von Röntgenstrahlung aber abgelehnt.

11
12 Die Verwendung eines DDREF von 2 für locker ionisierende Strahlung wird durch epidemio-
13 logische Studien nicht gestützt. Er sollte daher nicht weiter verwendet werden. Diese Positi-
14 on weicht deutlich von der Position der ICRP in ihren neuen Empfehlungen ab, die sich im
15 Gegensatz zu den hier zugrunde gelegten epidemiologischen Daten weitgehend auf tierex-
16 perimentelle und strahlenbiologische Studien abstützt. Die Expositionsbedingungen bei der
17 überwiegenden Zahl der beruflich strahlenexponierten Personen in Deutschland entsprechen
18 der Expositionscharakterisierung unter der der DDREF Anwendung findet, nämlich einer
19 protrahierten bzw. chronischen Exposition durch Röntgen- bzw. Gammastrahlung.

20

1 A.II.3 Gewebe-Wichtungsfaktoren

3 *Hintergrund*

5 In der ICRP-Empfehlung 60 werden Gewebe-Wichtungsfaktoren eingeführt, durch welche
6 die unterschiedliche Strahlenempfindlichkeit der einzelnen Organe und Gewebe für sto-
7 chastische Strahlenwirkungen berücksichtigt werden. Mit Hilfe des Gewebe-Wichtungsfak-
8 tors wird aus der Energiedosis für einzelne Organe die effektive Dosis als eine Ganzkörper-
9 dosis berechnet, wenn verschiedene Gewebe oder Organe insbesondere bei Teilkörperex-
10 positionen und bei der Inkorporation von Radionukliden unterschiedlich hoch strahlenexpo-
11 niert sind.

13 Bei der effektiven Dosis handelt es sich um eine Energiedosis, die für die Strahlungsart **und**
14 die Strahlenempfindlichkeit betroffener Organe und Gewebe gewichtet ist.

15 Die Größe „Effektive Dosis“ ist damit eine Abschätzgröße für die Zwecke des praktischen
16 Strahlenschutzes und sollte daher auch nur dort zur Anwendung kommen. Weiter einge-
17 schränkt gilt sie nur für den Bereich unterhalb der Schwelle für deterministische Strahlen-
18 wirkungen. Die effektive Dosis erlaubt Abschätzungen des Strahlenrisikos für Personengrup-
19 pen, z.B. die der beruflich Strahlenexponierten, nicht jedoch für Individuen.

21 Die Abschätzung des Strahlenrisikos für Personengruppen wird erreicht durch Normierung
22 der Summe der Gewebe-Wichtungsfaktoren auf eins. Die Werte der Gewebe-
23 Wichtungsfaktoren hängen vom jeweiligen Kenntnisstand der Strahlenbiologie und –epi-
24 demie ab. Daher können sie mit der Zeit Änderungen unterworfen sein. Die derzeit gel-
25 tenden Werte wurden in der ICRP 60 empfohlen und in der EU-Richtlinie und in der Strah-
26 lenschutzverordnung normativ festgelegt. Werden zur Abschätzung von Verursachungs-
27 wahrscheinlichkeiten und individuellen Strahlenrisiken Werte verwendet, die von den ICRP-
28 Empfehlungen abweichen, so ist dies explizit zu begründen. Falls die Dosisberechnung mit
29 einem abweichenden Gewebe-Wichtungsfaktor durchgeführt wird, handelt es sich beim Er-
30 gebnis nicht um eine effektive Dosis im Sinne der normativen Festlegungen.

32 Zur Bestimmung der Gewebe-Wichtungsfaktoren wurden von der ICRP die folgenden Kom-
33 ponenten berücksichtigt:

- 34 • Das attributable Leukämie- und Krebsmortalitätsrisiko,
- 35 • die gewichtete Wahrscheinlichkeit für attributable Leukämien und Krebs ohne To-
36 desfolge,
- 37 • die gewichtete Wahrscheinlichkeit schwerwiegender vererbbarer Wirkungen,
- 38 • der relative Verlust an Lebenszeit durch Leukämie oder Krebs.

1 *Thesen*

2

3 ▪ Dem Verfahren der ICRP zur Festlegung von Gewebe-Wichtungsfaktoren sollte weiterhin
4 grundsätzlich gefolgt werden.5 ▪ Wegen der besonderen Strahlenempfindlichkeit der weiblichen Brustdrüse ist aber die
6 Festlegung und Anwendung geschlechtsspezifischer Gewebe-Wichtungsfaktoren not-
7 wendig. In konsequenter Analogie zu dieser Notwendigkeit ergibt sich dann auch eine Ü-
8 berprüfung der Strahlenrisikoeffizienten auf ihre geschlechtsspezifische Bedeutung.9 ▪ Die Festlegungen zu einzelnen Gewebe-Wichtungsfaktoren sind zu gegebener Zeit zu
10 überprüfen.

11

12 *Begründung*

13

14 Bei den Gewebe-Wichtungsfaktoren handelt es sich um normative Festsetzungen, bei denen
15 nicht nur epidemiologische Befunde und strahlenbiologische Erkenntnisse berücksichtigt
16 werden, sondern es muss auch eine gewisse Praktikabilität für die Strahlenschutz-Anwen-
17 dung gewährleistet sein. Damit erklärt sich auch die Beschränkung auf die vier Werte für
18 Gewebe-Wichtungsfaktoren: 0,20; 0,12; 0,05 und 0,01. Eine Änderung der Gewebe-Wich-
19 tungsfaktoren ist nur durch Änderung bestehender Vorschriften möglich. Wegen der beson-
20 deren Strahlenempfindlichkeit der weiblichen Brustdrüse ist die Festlegung und Anwendung
21 geschlechtsspezifischer Gewebe-Wichtungsfaktoren notwendig. Das Strahlenrisiko der Frau
22 wird, auf der Basis des absoluten Strahlenrisikos betrachtet, zu etwa 25 bis 30% bestimmt
23 durch das Brustkrebsrisiko. Der zur Zeit festgelegte Gewebe-Wichtungsfaktor für das Brust-
24 organ von 0,05 entspricht nicht mehr dem o.g. heutigen Wissen zum strahlenbedingten
25 Brustkrebsrisiko. Eine Anpassung ist daher notwendig. Der Entwurf der neuen Empfehlun-
26 gen der ICRP schlägt hierzu einen neuen Wert vor. Die Verwendung von gemittelten Werten
27 über beide Geschlechter führt weiterhin dazu, dass das strahlenbedingte Brustkrebsrisiko bei
28 der Frau stark unterschätzt und das des Mannes weit überschätzt wird. Daraus folgt unmit-
29 telbar eine systematische Überschätzung der relativen Risiken für alle anderen Organe und
30 Gewebe der Frau bzw. eine systematische Unterschätzung für die des Mannes. Eine Be-
31 grenzung der Organdosis für das Brustorgan der Frau kann diese systematischen Unter-
32 bzw. Überschätzungen auch bei starker Mittelung der Werte dann nicht aufheben, wenn die
33 Strahlenempfindlichkeit eines Organs das Strahlenrisiko bei einem Geschlecht maßgeblich
34 bestimmt.

35

36 Die Gewebe-Wichtungsfaktoren der ICRP sollten nur Anwendung finden bei der Abschät-
37 zung von Strahlenrisiken von Bevölkerungsgruppen. Für Einzelpersonen sind die jeweils
38 besten Schätzwerte für die Strahlenempfindlichkeit des betroffenen Organs zu verwenden.

39

- 1 Die Einführung geschlechtsspezifischer Gewebe-Wichtungsfaktoren hat Auswirkungen auf
- 2 alle Bereiche des Strahlenschutzes, in denen konkret effektive Dosen geschlechtsspezifisch
- 3 abgeschätzt und erfasst werden können bzw. müssen. Vordringlich ist dies für beruflich
- 4 strahlenexponierte Personen der Fall.
- 5
- 6 Nach UNSCEAR 2000 beträgt das zusätzliche absolute Strahlenrisiko (EAR) bezogen auf
- 7 1 Sv bei Männern etwa 9% und bei Frauen etwa 13%. Dieser Unterschied ist zurückzuführen
- 8 auf das strahlenbedingte Brustkrebsrisiko und die höhere Lebenserwartung von Frauen im
- 9 Vergleich zu Männern.

A.II.4 Strahlungs-Wichtungsfaktoren (Photonen, Neutronen, Protonen)

Hintergrund

Die unterschiedlich starke biologische Wirkung verschiedener Strahlungsarten und -qualitäten bei gleicher Energiedosis wird im Strahlenschutz bei der Berechnung der Äquivalentdosis durch Strahlungs-Wichtungsfaktoren berücksichtigt. Die Werte dazu wurden in der ICRP-Empfehlung 60 (1991) festgelegt und in ICRP-Empfehlung 92 (2003) einer kritischen Würdigung unterzogen. Im April 2003 fand im BfS zur „Berücksichtigung der RBW bei der Bestimmung der effektiven Dosis“ ein Fachgespräch statt. Die SSK hat mit „Vergleichende Bewertung der Risiken verschiedener Strahlungsarten“ im Jahr 2004 eine Stellungnahme verabschiedet.

Thesen

- Das Konzept der Strahlungs-Wichtungsfaktoren, wie es in der ICRP-Empfehlung 60 dargestellt ist, wird grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Es sollten jedoch, den Empfehlungen der SSK von 2004 folgend, Anpassungen für Protonen und Neutronen vorgenommen werden.
- Die Strahlungs-Wichtungsfaktoren der ICRP sollten nur im Strahlenschutz und bei der Abschätzung sowie der Registrierung von Strahlenexpositionen für bestimmte Überwachungsaufgaben Anwendung finden.
- Für individuelle Risikoabschätzungen unter genau definierten Bedingungen der Strahlenexposition sollten nicht die Strahlungs-Wichtungsfaktoren der ICRP benutzt werden, sondern es sind die Energiedosen und die jeweils besten Schätzwerte auf Basis der vorliegenden Daten zur relativen biologischen Wirksamkeit der in Betracht kommenden Strahlungsarten und -qualitäten zu verwenden.
- Zur besseren Verständlichkeit der Strahlungs-Wichtungsfaktoren und um eine eindeutige Bezugsbasis zu schaffen, sollte die Referenzstrahlung eindeutig definiert werden. Da die Abschätzung des Strahlenrisikos überwiegend auf den Daten der Überlebenden der Atombombenabwürfe in Japan beruhen, wird empfohlen, Gammastrahlung als Referenzstrahlung festzulegen.

Begründung

Im Fachgespräch des BfS zur RBW im Jahr 2003 wurde grundsätzlich die Vorgehensweise der ICRP zur Bestimmung der Strahlungs-Wichtungsfaktoren bestätigt. Auch die SSK folgt in ihrer Empfehlung zur RBW von 2004 grundsätzlich dem Vorgehen der ICRP. Nur in den Anwendungsbereichen der Strahlungs-Wichtungsfaktoren empfiehlt die SSK genauere Vorga-

1 ben als die ICRP. Genau wie die Gewebe-Wichtungsfaktoren wurden die Strahlungs-Wich-
2 tungsfaktoren von der ICRP normativ für die Bestimmung der effektiven Dosis festgelegt.
3 Wird von den vorgegebenen Werten abgewichen, dann kann nicht mehr von einer effektiven
4 Dosis im Sinne der ICRP gesprochen werden, sondern es muss eine andere Dosisbezeich-
5 nung benutzt werden. Eine Verwendung abweichender Wichtungsfaktoren ist daher immer
6 explizit zu benennen.

7
8 Da bei der Exposition durch Photonenstrahlung häufig mit einer Mischung von Photonen
9 unterschiedlicher Energien zu rechnen ist, ist aus Gründen der Praktikabilität bei der Über-
10 wachung von Strahlenexpositionen beruflich strahlenexponierter Personen weiterhin grund-
11 sätzlich für Photonen ein Strahlungs-Wichtungsfaktor $w_R = 1$ zu verwenden.

12
13 Experimentell ermittelte RBW-Werte mit Protonen-Strahlung weisen darauf hin, dass für die-
14 se Strahlung ein Wert von 2 den Befunden besser entspricht als der derzeitige ICRP-Wert
15 von 5. Daher sollte dieser Strahlungs-Wichtungsfaktor entsprechend angepasst werden.

16
17 Für die Neutronenstrahlung werden Strahlungs-Wichtungsfaktoren empfohlen, deren Höhe
18 von der Energie der Strahlung bestimmt wird. Jedoch sollte, wie in der ICRP-Empfehlung 92
19 (2003) und der SSK-Empfehlung zur RBW (2004) beschrieben, besser eine kontinuierliche
20 als eine stufenförmige Funktion der Abhängigkeit von Neutronenenergie und Höhe des
21 Strahlungs-Wichtungsfaktors benutzt werden. Der maximale Wert liegt für eine Neutronen-
22 energie von 1 MeV bei 20.

23
24 Für individuelle Risikoabschätzungen ist analog zum Verfahren bei Gewebe-Wichtungsfakto-
25 ren immer der jeweils beste Schätzwert für den Strahlungs-Wichtungsfaktor auf der Basis
26 der relativen biologischen Wirksamkeit der relevanten Strahlenqualität zu verwenden. In A-
27 nalogie gilt dies selbstverständlich auch für die jeweils besten Schätzwerte für die individu-
28 ellen Risikokoeffizienten für das Strahlenrisiko (u.a. differenziert nach Alter, Geschlecht etc.).

29
30 Das bestehende System aus Strahlungs-Wichtungsfaktoren für den Strahlenschutz und
31 Qualitätsfaktoren für den Bereich der Dosis-Messgrößen sollte beibehalten werden. Eine
32 analoge Anpassung der Qualitätsfaktoren an die Änderungen der Strahlungs-Wichtungsfak-
33 toren bei Protonen und Neutronen ist anzustreben.

1 **A.II.5 Kollektivdosis**

3 *Hintergrund*

5 Nach ICRP-Empfehlung 60 ist die Kollektivdosis definiert als Produkt des arithmetischen
6 Mittels der Individualdosen und der Zahl der Exponierten. Das Konzept war in den 70er Jah-
7 ren eingeführt worden, um das unkontrollierte Anwachsen von Dosisbeiträgen langlebiger
8 Radionuklide in der Umwelt zu begrenzen. Für bestimmte (wiederkehrende) Anwendungen,
9 z.B. bei Wartungsarbeiten in Kernkraftwerken, wurde und wird die Kollektivdosis angewandt,
10 um Fragen der Kosten-Nutzen Relation zu beantworten. Es ist evident, dass eine Aufsum-
11 mierung minimaler Dosisbeiträge über eine sehr große Personenzahl (z.B. die Weltbevölke-
12 rung) bzw. über sehr lange Zeiträume (z.B. mehrere Generationen) zu einer Überschreitung
13 der Grenzen der Anwendbarkeit dieses Dosisbegriffs führt. Da die Verteilung der Höhe der
14 berücksichtigten Individualdosen oft über mehrere Größenordnungen gehen kann und Ab-
15 schätzfehler und Unsicherheiten u.a. abhängig von der absoluten Höhe der Dosis sind, kann
16 eine fachlich begründete Anwendung der Kollektivdosis in wohl definierten Anwendungsfäl-
17 len sinnvoll sein, eine Bewertung im Sinne einer Risikoaussage für eine Bevölkerungsgruppe
18 dagegen ist fachlich falsch und damit unsinnig.

19
20 Vor Anwendung des Kollektivdosisbegriffes ist zu prüfen, ob die Grundlagen und Randbe-
21 dingungen dafür gegeben sind. Das Kollektivdosisbegriff ist nur für stochastische Strahlen-
22 risiken anwendbar, für die eine lineare Beziehung zwischen Dosis und Wirkung und eine
23 Unabhängigkeit von der Dosisleistung gegeben ist. Eine solche Proportionalität zwischen der
24 Dosis und dem Strahlenrisiko („lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung“) wird auch für den Be-
25 reich niedriger Dosen angenommen. Die heute vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnis
26 zum Strahlenrisiko ergeben trotz der Unsicherheiten, mit denen der Risikoeffizient im
27 Niedrigdosisbereich behaftet ist, eine überwiegende Evidenz für die Richtigkeit der Annahme
28 einer linearen Beziehung im Bereich niedriger Dosen. Den Strahlenexpositionen im niedrigen
29 Dosisbereich ist aber aus Gründen der Nachweisbarkeit nur ein kalkulatorisches, nicht aber
30 ein gesichertes reales Risiko zuzuordnen.

31
32 Voraussetzung für die Anwendung der Kollektivdosis ist außerdem, dass die betroffene Per-
33 sonengruppe hinsichtlich Alter und Geschlecht und die Verteilung der Individualdosen inner-
34 halb der Gruppe hinreichend genau bekannt sein müssen. Für eine Gruppe beruflich strah-
35 lenexponierter Personen kann dies in vielen Fällen näherungsweise angenommen werden.
36 Außerdem können die Individualdosiswerte relativ genau aus der Überwachung von Be-
37 schäftigten in vergleichbaren Situationen oder als Ergebnis von Berechnungen vorhergesagt
38 werden. Deshalb kann in diesen Fällen die Kollektivdosis als Bewertungsmaßstab für die
39 Zwecke der Optimierung im Strahlenschutz Verwendung finden.

1 Die derzeitigen Diskussionen im internationalen Rahmen zielen auf eine Fortentwicklung des
2 Konzepts der ICRP-Empfehlung 60 ab und haben folgenden Hintergrund:

3
4 Für die Entscheidung über Strahlenschutzmaßnahmen ist es nicht gleichbedeutend, ob eine
5 kleine Zahl von Personen eine hohe Dosis erhält oder eine große Zahl eine sehr kleine.
6 Während die jeweils höchsten Dosiswerte interessant sind im Hinblick auf das Vorliegen von
7 Grenzwertüberschreitungen, tragen sie ggf. nur wenig zur Kollektivdosis bei. Im Interesse
8 eines prioritär auf den Einzelnen und nachrangig auf eine Bevölkerungsgruppe abzielenden
9 Strahlenschutzes ist es deshalb notwendig, der Verteilung der Individualdosiswerte eines
10 Kollektivs als Grundlage für Strahlenschutzüberlegungen einen höheren Stellenwert
11 beizumessen als der Summe der Werte. Für den Bereich der beruflichen Strahlenexposition,
12 für den Individualdosiswerte vorliegen, sind die Voraussetzungen für die Anwendung des
13 Kollektivdosisbegriffes gegeben. Die neuesten Auswertungen der Daten des Strahlen-
14 schutzregisters folgen diesem (noch keineswegs allgemein akzeptierten) Prinzip und bezie-
15 hen auch weitere Kennzahlen wie alters- und geschlechtsspezifische Informationen in die
16 Überlegungen mit ein. Zur Abschätzung des Risikos als Schadensmaß für die Gesamtbevöl-
17 kerung oder Gruppen der Bevölkerung, bei denen die Kollektivdosis aus kleinen individuellen
18 Dosisbeiträgen resultiert, denen nur ein kalkulatorisches Risiko zugeordnet werden kann, ist
19 die Kollektivdosis wegen der in diesem Dosisbereich nicht gesicherten Dosis-
20 Wirkungsbeziehung und den Unsicherheiten ihrer Ermittlung nicht geeignet.

21 22 *Thesen*

- 23
- 24 ▪ Der Strahlenschutz bei beruflicher Strahlenexposition stützt sich in erster Linie auf die
25 individuelle Dosisbetrachtung. Zusätzlich kann eine Betrachtung der Kollektivdosis sinn-
26 voll sein. Dabei ist die Häufigkeitsverteilung der individuellen Dosiswerte zugrunde zu le-
27 gen. Weitere Informationen (Alter, Geschlecht, Art der Tätigkeit) müssen, soweit vor-
28 handen, berücksichtigt werden.
 - 29 ▪ Für die Frage des Strahlenschutzes der Bevölkerung in Situationen, in denen langlebige
30 Radionuklide eine Rolle spielen, ist die Abschätzung und Bewertung der Verteilung der
31 Individualdosen bei Planungen und Genehmigung (z.B. bei der Freigabe) der zielführen-
32 de Ansatz.
 - 33 ▪ Die Abschätzung der Verteilung von Individualdosen bzw. der Kollektivdosis liefert nur
34 dann eine Entscheidungsgrundlage für Bewertungen und Optimierungen im Strahlen-
35 schutz, wenn einerseits die exponierte oder potentiell exponierte Population hinreichend
36 gut charakterisiert und andererseits die Verteilung der Expositionen gut beschrieben
37 werden kann. Liegt eine starke heterogene Verteilung der Expositionen vor, so ist die
38 Abschätzung der Kollektivdosis aus fachlicher Sicht nicht sinnvoll. Um eine gute Be-
39 schreibbarkeit einer potentiell exponierten Population insbesondere im Fall heterogener

1 Expositionen zu erreichen, kann es hilfreich sein, ein räumliches und/oder zeitliches Ab-
2 schneiden nach Außen vorzunehmen. Dabei ist streng darauf zu achten, dass durch die-
3 ses Abschneiden kein Expositionsbereich, der mit relevanten Risikoerhöhungen verbun-
4 den ist, aus der Abschätzung und der Bewertung ausgeschlossen wird. Dies ist nur dann
5 gewährleistet, wenn die Abschneidekriterien signifikant unterhalb bestehender Risiko- o-
6 der Dosisstrahlen liegen.

9 *Begründung*

10
11 Im Bereich der beruflichen Strahlenexposition, für den weitgehend IT-gestützte Parameter
12 zur Beschreibung exponierter Gruppen und individuelle Dosiswerte verfügbar sind, ist neben
13 der Abschätzung und Bewertung der individuellen Dosiswerte auch deren Verteilung in die
14 Überlegungen des praktischen Strahlenschutzes einzubeziehen. Eine differenzierte Be-
15 trachtung verschiedener Parameter, die die Dosisverteilung beeinflussen, ermöglicht es,
16 spezifische Fragen im Hinblick auf Dosisbegrenzung und -minimierung zu beantworten.
17 Durch eine Fokussierung auf die Abschätzung und Bewertung der Kollektivdosis wird die
18 individuell vorhandene Information zur beruflichen Strahlenexposition in einem Wert zusam-
19 mengefasst, der im Sinne eines allgemeinen Trends der Entwicklung der Expositionen noch
20 informativ ist, aber wichtige Informationen zur Minimierung der Expositionen verloren hat.
21 Aus diesem Grund ist der Betrachtung der Expositionsverteilung und der sie beeinflussenden
22 Expositionsparameter eindeutig der Vorzug vor der Kollektivdosis einzuräumen.

23
24 Für eine Bevölkerungsgruppe kann, wenn die Gruppe groß genug ist, die Altersverteilung als
25 der Verteilung in der jeweiligen Gesamtbevölkerung entsprechend angenommen werden.
26 Die Größe der betroffenen Gruppe kann geschätzt werden. Für eine Bewertung der Expositi-
27 onen bei Kontaminationen durch langlebige Radionuklide und der Maßnahmen, die zur Ver-
28 minderung dieser Expositionen vorgesehen sind, müssen Aussagen über lange Zeiträume
29 gemacht werden. Angaben über die Bevölkerungsentwicklung sind aber nur für vergleichs-
30 weise kurze Zeiträume (wenige Jahrzehnte) verfügbar. Projektionen über die Größe der zu
31 betrachtenden Bevölkerungsgruppe für lange Zeiträume sind mit erheblichen Unsicherheiten
32 behaftet. Änderungen in der Altersentwicklung, die nicht zuletzt mit dem medizinischen Fort-
33 schritt zusammenhängt, der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten usw. lassen sich nicht
34 oder nur mit großen Unsicherheiten für begrenzte Zeiträume vorhersagen. Innerhalb einer
35 Bevölkerungsgruppe können die Individualdosen sehr inhomogen und über große Bereiche
36 verteilt sein. Daher resultiert der überwiegende Anteil der Kollektivdosis meist aus einer gro-
37 ßen Anzahl von Personen mit sehr geringen Individualdosen. Ein zusätzliches Problem be-
38 steht darin, dass die Individualdosiswerte nicht gemessen, sondern nur mit Hilfe von Model-
39 len berechnet werden können. Die unvermeidlichen Modellunsicherheiten erhöhen zusätzlich

1 die Unsicherheiten bei der Berechnung der Kollektivdosis. All diese Faktoren führen dazu,
2 dass die Anwendung der Kollektivdosis auf Bevölkerungsgruppen in aller Regel nicht infor-
3 mativ sind, für die Zwecke des Strahlenschutzes nicht oder kaum angewendet werden kön-
4 nen und allenfalls dazu dienen können, Expositionstrends abzuschätzen. Um einen Bevölke-
5 rungsbezug in Risikoabschätzung und -bewertung sowie in der Maßnahmenabschätzung im
6 Strahlenschutz zu ermöglichen, ist die Betrachtung von Expositionsverteilungen innerhalb
7 der relevanten Bevölkerungsgruppe und eine Abschätzung und Bewertung der Parameter
8 notwendig, die diese Expositionsverteilung wesentlich beeinflussen. Eine solche parameter-
9 basierte Betrachtung ermöglicht es, sensitive Einflussfaktoren zu identifizieren und diese im
10 Hinblick auf die Expositionsminimierung durch Strahlenschutzmaßnahmen zu überprüfen.

A.II.6 Verfahren zur Expositionsbestimmung der Bevölkerung

Hintergrund

In Artikel 45 der EU-Grundnormen wird gefordert, dass die Abschätzung von Dosen, die die Bevölkerung bzw. Referenzgruppen oder -personen aufgrund der radioaktiven Ableitungen aus kerntechnischen Anlagen und nuklearmedizinischen Einrichtungen erhalten, so realistisch wie möglich (dies bedeutet, an der tatsächlichen Exposition der betrachteten Personen orientiert) erfolgen soll.

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren müssen in Deutschland zur (prospektiven) Dosisabschätzung hingegen konservative, die tatsächliche Exposition systematisch überschätzende Modelle, Annahmen und Parameter verwendet werden, wie sie in der AVV zu § 47 StrlSchV niedergelegt sind.

Die gleichen konservativen Modelle und Annahmen werden dann aber auch bei der Ermittlung der jährlichen Strahlenexposition der Bevölkerung (retrospektive Dosisabschätzung) infolge der Radionuklidableitungen mit Luft und Wasser und bei der Ermittlung der Vorbelastung durch radioaktive Ableitungen (insbesondere I-131) aus nuklearmedizinischen Einrichtungen mit dem Abwasser eingesetzt, allerdings modifiziert durch eine aufwendige Berücksichtigung der atmosphärischen Ausbreitung auf der Basis standortspezifischer Messwerte und der realen statt der maximalen genehmigten Ableitungen seit Betriebsbeginn.

Thesen

- Die bisher in Deutschland übliche Expositionsermittlung anhand konservativer radioökologischer Modelle sollte für Planungszwecke, Genehmigungsverfahren und andere prospektive Abschätzungen beibehalten werden.
- Eine Ausnahme bilden Planungen, bei denen die Auswirkungen anhand risiko-orientierter Bewertungsverfahren beurteilt werden. Bei diesen sollten Expositionen und daraus resultierende Risiken median-orientiert berechnet werden.
- Eine realistische Dosisermittlung ist wünschenswert für die Expositionsabschätzung durch radioaktive Stoffe, die in der Umwelt schon vorhanden sind und durch Emissionen infolge genehmigter Tätigkeiten. Dies betrifft gleichermaßen Tätigkeiten wie Arbeiten.
- Angesichts des potentiellen Aufwandes sollte bei der retrospektiven Berechnung auf eine realistische Dosisermittlung verzichtet werden, wenn schon konservative Abschätzungen zeigen, dass nur vernachlässigbare Expositionen auftreten können.

1 *Begründung*

2

3 Eine konservative Ermittlung von Expositionen mit dem Instrumentarium der AVV zu § 47
4 StrlSchV oder analog hierzu ist dann erforderlich, wenn es sich um Planungsaspekte han-
5 delt. Dies folgt direkt aus der Tatsache, dass jede Verwaltungsentscheidung aus Gründen
6 der Rechtssicherheit sowohl den Adressaten der Emissionserlaubnis als auch den potentiell
7 exponierten Personen gegenüber auf einer abdeckenden, mögliche zukünftige Änderungen
8 einzelner Belastungspfade berücksichtigenden Expositionsprognose basieren muss. Modifi-
9 kationen dieser Verfahrensweise würden wahrscheinlich die im Laufe von mehr als 20 Jah-
10 ren mühsam erreichte Rechtssicherheit in Frage stellen.

11

12 Anders stellt sich die Situation dar im Falle risiko-orientierter Bewertungsverfahren, wie sie
13 das BfS für das Endlager-Standortsuchverfahren vorschlägt, da eine konservative Vorge-
14 hensweise mit in der Summe meist unbekannter Überschätzung der Expositionen und dar-
15 aus resultierender Risiken jede vergleichende risiko-orientierte Bewertung unmöglich werden
16 lässt. Hier sind daher an den tatsächlich zu erwartenden Expositionen orientierte Berech-
17 nungsverfahren erforderlich. Dabei bietet sich aus praktischen und prinzipiellen Gründen
18 eine median-orientierte Vorgehensweise an. So ist der Median häufig schon auf schmaler
19 Datenbasis zuverlässig schätzbar. Dosiskonversionsfaktoren und Risikoschätzer der ICRP
20 sind z. B. median-orientiert. Häufig sind nur mittlere Risiken bekannt, die zudem unempfind-
21 lich gegen extreme Einzelszenarien oder -verhaltensweisen sind.

22

23 Eine möglichst realistische Ermittlung von Expositionen gemäß der Vorgaben des Artikel 45
24 der EU-Grundnormen ist erforderlich zur Bewertung existierender Immissionen, um nicht zu
25 falschen behördlichen Entscheidungen zu gelangen – beispielsweise bei Entscheidungen
26 über die Sanierungsbedürftigkeit radioaktiver Altlasten (bei denen in Deutschland realistische
27 Modellierungen benutzt werden) oder bei der Kontrolle der Einhaltung von Grenzwerten
28 durch laufende Anlagen.

29

30 Nicht sinnvoll ist eine realistische Dosisermittlung in den oben aufgeführten Fällen dann,
31 wenn schon eine einfache konservative Abschätzung zu dem Ergebnis führt, dass lediglich
32 vernachlässigbar geringe Expositionen (beispielsweise geringer als der für Freigabe zugrun-
33 degelegte Dosiswert) auftreten können. In solchen Fällen wäre nämlich nicht nur der erhebli-
34 che finanzielle Aufwand, der zur Ermittlung realistischer Expositionen erforderlich ist, schwer
35 begründbar, sondern es würde auch fälschlicherweise das Signal gesetzt, dass in einem sol-
36 chen Expositionsbereich eine möglichst genaue Expositionsermittlung erforderlich ist für eine
37 Risikoabschätzung.

1 III. Spezielle Anwendungsgebiete

3 A.III.1 Freigabe

5 *Hintergrund*

7 Mit der vermehrten Stilllegung und dem Rückbau von Kernkraftwerken in den nächsten Jahr-
8 zehnten werden Fragestellungen zur Freigabe großer Mengen schwach radioaktiver Stoffe
9 zunehmend in den Vordergrund rücken. Zu deren Beantwortung sind zahlreiche Rahmen-
10 richtlinien, Leitfäden für Genehmigungen und Ausführungsbestimmungen sowie Modelle zur
11 Ermittlung von Dosen, insbesondere von Kollektivdosen zu erarbeiten. Hierzu ist es notwen-
12 dig, die tatsächlichen Materialströme und deren Kontaminationsniveaus zu kennen.

14 Derzeit werden Fragen der Freigabe national und international diskutiert. Schwerpunkte bil-
15 den hier die Festlegung numerischer Werte für die Freigabe durch die IAEA, die sämtlich auf
16 radioökologischen Modellsimulationen beruhen, die Rolle der Kollektivdosis definiert durch
17 ICRP und eine Modifizierung der in der StrlSchV befindlichen Werte (SSK).

19 In der Bundesrepublik Deutschland wird die Freigabe genehmigt, wenn für Einzelpersonen
20 der Bevölkerung eine effektive Dosis im Bereich von 10 μSv im Kalenderjahr und eine Kol-
21 lektivdosis von 1 Personen-Sv eingehalten ist. Die Begrenzung der Kollektivdosis kann aller-
22 dings überschritten werden, wenn im begründeten Einzelfall Optimierungsüberlegungen da-
23 für sprechen.

25 *Thesen*

- 27 ▪ Bei der Herleitung von Freigabewerten müssen der bisherigen Vorgehensweise folgend
28 für die Begrenzung der Individualdosen konservative Expositionsmodelle herangezogen
29 werden. Die Begrenzung der Kollektivdosis hingegen sollte dagegen mit realistischen
30 Modellansätzen erfolgen. Den Modellierungen sollten die zukünftig in Deutschland zu er-
31 wartenden Bedingungen (Mengen, Aktivitätskonzentrationen etc.) zugrundegelegt wer-
32 den.
- 33 ▪ Es muss ausgeschlossen werden, dass in der Praxis durch Akkumulation von hohen
34 Mengen freigegebener Materialien auf wenigen Deponien höhere Expositionen als ange-
35 nommen auftreten.
- 36 ▪ Der Grenzwert für die effektive Dosis für Einzelpersonen der Bevölkerung sollte nicht "im
37 Bereich" von 10 $\mu\text{Sv/a}$ gewählt werden, sondern ist auf 10 $\mu\text{Sv/a}$ festzulegen. Der Nach-
38 weis ist mittels konservativer, abdeckender Berechnungsverfahren zu führen.

- 1 ▪ Eine internationale Harmonisierung ist anzustreben. Dies sollte jedoch nicht damit erkauf
2 werden, dass die konservative Methodik zur Herleitung oder die klare Trennung zwischen
3 den Dosiswerten für Freigabe (10 $\mu\text{Sv/a}$) und für Expositionen aus Tätigkeiten für Einzel-
4 personen der Bevölkerung (1 mSv/a) aufgegeben werden.

5
6

7 *Begründung*

8

9 Da die Herleitung von Freigabewerten und Freigrenzen und deren Angabe in der Strahlen-
10 schutzverordnung klassische Planungsinstrumente darstellen, die aufwendige Genehmi-
11 gungsverfahren für jeden Einzelfall ersetzen sollen (und insoweit ein vereinfachtes Geneh-
12 migungsverfahren darstellen), ist von konservativen Expositionsmodellen auszugehen, um
13 eine Einhaltung des Dosiswerts von 10 $\mu\text{Sv/a}$ für die am höchsten exponierten Personen der
14 Bevölkerung zu gewährleisten. Für die Begrenzung der Kollektivdosis als Planungsinstru-
15 ment hingegen sollte vermieden werden, dass berechnete Werte dieser Größe wesentlich
16 durch die Summation (unbekannter) Konservativitätsfaktoren bedingt werden und damit ihrer
17 Aussagekraft verlustig gehen. Eine möglichst exakte Berücksichtigung der in Deutschland in
18 den nächsten Jahrzehnten infolge Stilllegung und Abriss kerntechnischer Anlagen zu prog-
19 nostizierenden Mengen, Aktivitätskonzentrationen, Volumina, etc. ist erforderlich, um nicht
20 auf der Basis generischer Modelle abgeleitete Freigabewerte entweder korrigieren oder mit
21 ihrer Beibehaltung eine mögliche Überschreitung des Dosiswerts von 10 $\mu\text{Sv/a}$ in Kauf zu
22 nehmen zu müssen.

23

24 Derzeit sind nur wenige konventionelle Deponien bereit, freigegebene Materialien (bei-
25 spielsweise Bauschutt) anzunehmen. Dies führt dazu, dass diese Deponien intensiv zur Ent-
26 sorgung von Stoffen aus der Freigabe genutzt werden. Falls dieser Trend anhält, ist davon
27 auszugehen, dass auf diesen Deponien deutlich höhere Mengen freigegebener Materialien
28 abgelagert werden, als in den zur Zeit durchgeführten Modellrechnungen zur Herleitung von
29 Freigabewerten angenommen wird. Um eine solche Entwicklung mit ihrer Konsequenz einer
30 Überschreitung der maximalen (Individual- oder Kollektiv-) Dosiswerte zu verhindern, müs-
31 sen entweder die Modelle entsprechend angepasst werden – Folge wären durchweg deutlich
32 niedrigere Freigabewerte –, oder es müsste z. B. eine zentrale Registrierung der deponierten
33 Mengen und Aktivitätskonzentrationen aus Freigabe-Entscheidungen erfolgen, um Akkumu-
34 lationen auf einzelnen Deponien gegebenenfalls begrenzen zu können.

35

36 International wurden jüngst zunehmend Ansätze vorgestellt, in denen die allgemein aner-
37 kannte Geringfügigkeitsschwelle von 10 $\mu\text{Sv/a}$ mit dem Bevölkerungsgrenzwert von 1 mSv/a
38 vermischt wird – sei es, dass die 10 $\mu\text{Sv/a}$ als Häufungspunkt einer Verteilung, die bis zu
39 1 mSv/a reicht, angesehen werden, sei es, dass für Modellrechnungen zur Herleitung von

1 Freigabewerten/Freigrenzen von einer zulässigen Dosis von 1 mSv/a ausgegangen wird,
2 falls die zugrundeliegenden Modellszenarien und -parameter als konservativ eingeschätzt
3 werden. Eine Übernahme dieser Ansätze, die auch in Entwürfen von Safety Guides der IAEA
4 zu finden sind (DS 161: Radioactivity in Materials not requiring Regulation for Purposes of
5 Radiation Protection), würden zum einen dazu führen, dass die in der StrlSchV derzeit be-
6 findlichen restriktiven Werte angepasst werden müssten. Zum anderen wäre eine Vermi-
7 schung des Dosiswertes zur Festlegung einer Unerheblichkeitsschwelle und des Grenzwert-
8 es des Bevölkerungsschutzes die Folge, die die Risikokommunikation beider Werte erheb-
9 lich erschweren dürfte.

A.III.2 Begrenzung der Exposition durch Radon in Gebäuden

Hintergrund

In Deutschland beträgt die mittlere Konzentration radioaktiven Radons in Gebäuden etwa 50 Bq/m³ Raumlufte, wobei die Werte in einzelnen Gebäuden als Resultat unterschiedlicher geologischer Eigenschaften des Untergrundes, der Bauweise und der Lüftungsgewohnheiten um mehrere Größenordnungen schwanken können. Die Gesamtevidenz bisher durchgeführter Indoor-Studien zum Lungenkrebsrisiko durch Radon zeigt, dass eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Schwellenwert die Daten am besten beschreibt. Da selbst geringe Radonkonzentrationen zu einem geringen Anstieg des Lungenkrebsrisikos führen und ein Großteil der Bevölkerung davon betroffen ist, wird ein nicht zu vernachlässigender Teil (geschätzt werden etwa 7 bis 9%) der jährlichen Lungenkrebserkrankungen in Deutschland durch Radon verursacht – lediglich der Einfluss des Rauchens ist hier deutlich höher zu veranschlagen. Radon in Gebäuden stellt mithin das nach derzeitigem Wissensstand höchste umweltbedingte radiologische Risiko dar.

Nicht zuletzt durch die umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die in den letzten zwei Jahrzehnten durch BMU/BfS und im Rahmen von Ressortforschungs-Projekten durchgeführt wurden, konnten die wesentlichen geologischen und bautechnischen Einflussfaktoren auf die Radonkonzentration in Häusern aufgeklärt werden.

Thesen

- Die heutigen detaillierten Kenntnisse über das Gesundheitsrisiko durch Radon und relevante Einflussfaktoren erfordern und ermöglichen eine striktere rechtliche Regelung als die bisherige Vorgabe nicht-verbindlicher Richtwerte.
- Als Konzentration, bei deren Überschreitung Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind und als Ziel für die Reduzierung erhöhter Konzentrationen sollte ein Wert von 100 Bq/m³ Raumlufte (entsprechend einer jährlichen Dosis von ca. 2 mSv) angestrebt werden.
- Gleichberechtigt mit der Reduzierung erhöhter Konzentrationen in davon betroffenen einzelnen Gebäuden sollte eine Reduzierung des Mittelwertes der Radon-Konzentrationen aller Gebäude in Gebieten, in denen mit erhöhten Radonkonzentrationen gerechnet werden muss, angestrebt werden. Dazu sollten in diesen Gebieten nach der Radonkonzentration gestaffelte Maßnahmen zur Reduzierung des Radonübertritts aus dem Baugrund in die Wohnräume vorgeschrieben werden.

1 *Begründung*

2

3 Auswertungen von in Europa und weltweit durchgeführten epidemiologischen Indoor-Studien
4 zum Lungenkrebsrisiko durch Radon zeigen konsistent, dass eine lineare Dosis-Wirkungs-
5 Beziehung ohne Schwellenwert mit den Daten am besten vereinbar ist. Die epidemiologi-
6 schen Studien zeigen einen statistisch signifikanten Anstieg des Lungenkrebsrisikos mit stei-
7 gender Radonkonzentration. Als untere Nachweisgrenze der statistischen Signifikanz wurde
8 eine durchschnittliche Radonkonzentration über 30 Jahre von etwa 100 Bq/m^3 gezeigt. Als
9 Ziel zur Reduzierung erhöhter Radonkonzentrationen ist daher ein Wert von 100 Bq/m^3 an-
10 zusetzen.

11

12 Es kann gezeigt werden, dass eine Reduzierung des Mittelwertes der Radonkonzentration in
13 allen Gebäuden eine effektivere Reduzierung der zu erwartenden radonbedingten Lungen-
14 krebserkrankungen bewirkt als die alleinige Reduzierung einzelner deutlich erhöhter Werte.
15 Dies ist im Wesentlichen darin begründet, dass im ersteren Fall eine deutlich höhere Zahl an
16 Wohnungen (und damit Bewohnern) erfasst wird. Neben dem klassischen Ansatz der Kap-
17 pung von Spitzenwerten sollten daher gleichberechtigt Maßnahmen zur Reduzierung der
18 Radon-Konzentration (zumindest aller Neubauten in Gebieten mit erhöhten Radonkonzent-
19 rationen) ergriffen werden.

20

21 Es stehen erprobte bautechnische Verfahren zur Verfügung, die mit angemessenem finan-
22 ziellen Aufwand die Umsetzung beider Zielsetzungen einer solchen Reduktionsstrategie er-
23 möglichen.

A.III.3 Medizinische Strahlenexposition

Hintergrund

Die Strahlenexposition der Bevölkerung durch röntgendiagnostische bzw. nuklearmedizinische Untersuchungen ist in Deutschland mit etwa 1,8 mSv bzw. 0,14 mSv pro Kopf und Jahr im Vergleich zu anderen Health-Care-Level-I-Ländern relativ hoch. Dies ist im Wesentlichen auf die Häufigkeit der Untersuchungen zurückzuführen. Um den Strahlenschutz der Patienten zu optimieren, wurden im Rahmen der Novellierung der Strahlenschutz- (StrlSchV) und der Röntgenverordnung (RöV) die Aufgaben und Rechte der Ärztlichen und Zahnärztlichen Stellen (ÄS) erweitert und Diagnostische Referenzwerte (DRW) eingeführt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Qualität der Untersuchungen zu verbessern und die Dosis pro Untersuchung mittelfristig zu reduzieren. Diese Maßnahmen allein werden allerdings nicht ausreichen, um eine grundlegende Veränderung der aktuellen Situation zu erreichen.

Thesen

- Zukünftige Bemühungen zur Reduktion der Strahlenexposition der Bevölkerung durch strahlendiagnostische Maßnahmen müssen bei der rechtfertigenden Indikation ansetzen, die zur Zeit aus verschiedenen Gründen nicht so restriktiv gehandhabt wird, wie dies sowohl unter strahlenhygienischen als auch gesundheitsökonomischen Gesichtspunkten wünschenswert ist. So könnte nach Einschätzung des Präsidenten der Deutschen Röntgengesellschaft (Deutsches Ärzteblatt, 1999) etwa auf die Hälfte aller Röntgenuntersuchungen verzichtet werden.
- Um einen weiteren Anstieg der Strahlenexposition der Bevölkerung durch die radiologische und nuklearmedizinische Diagnostik zu vermeiden, sind neue Technologien frühzeitig strahlenhygienisch zu bewerten.
- Die flächendeckende Einführung von Früherkennungsmaßnahmen mittels radiologischer Verfahren erfordert eine strahlenhygienische Bewertung auf der Basis von Nutzen-Risiko-Analysen sowie der detaillierten Festlegung von strukturellen Mindestvoraussetzungen an das Früherkennungsprogramm im Rahmen der Zulassung gemäß § 25 Abs.1 RöV.

Begründung

Neben den bereits umgesetzten Maßnahmen zur Qualitätssicherung ist eine Verringerung der Anzahl an Untersuchungen die wirksamste Möglichkeit, die Strahlenexposition von Pati-

1 enten zu reduzieren. Während der Schwerpunkt der strahlenhygienischen Maßnahmen bis-
2 lang überwiegend den physikalisch-technischen Bereich betraf, ist zukünftig die Indikations-
3 stellung stärker zu beachten. Da sich die rechtfertigende Indikation aus einer Abwägung von
4 Nutzen und Risiko ergibt, ist die Kenntnis des Strahlenrisikos von entscheidender Bedeu-
5 tung. Leider ist vielen Radiologen und den meisten überweisenden Ärzten die der Risikoab-
6 schätzung zugrunde liegende Strahlenexposition einzelner Untersuchungsarten nicht ausrei-
7 chend bekannt. Die Aufstellung eines Indikationskatalogs einschließlich der zu erwartenden
8 Patientendosen, wie sie die Patientenschutzrichtlinie 97/43/Euratom fordert, könnte hier eine
9 Verbesserung erbringen. Ein weiterer praktikabler Lösungsansatz auf nationaler Ebene be-
10 steht darin, die Indikationsstellung für radiologische Anwendungen (wie in einigen Staaten
11 bereits praktiziert) in sogenannte Disease-Management-Programme – unter Berücksichti-
12 gung bereits bestehender Leitlinien von Seiten der Ärzteschaft bzw. einschlägiger Fachge-
13 sellschaften – einzubinden.

14
15 Die Einführung innovativer radiologischer und nuklearmedizinischer Techniken in die medizi-
16 nische Routine wird auch in Zukunft neue diagnostische und therapeutische Optionen eröff-
17 nen. Diese Entwicklung macht es erforderlich, die Regelungen zum Erwerb und zur Aktuali-
18 sierung der Fachkunde im Strahlenschutz in dem jeweiligen Bereich kontinuierlich anzupas-
19 sen (aktuelles Beispiel: Teleradiologie). Darüber hinaus ist die Strahlenexposition der Pati-
20 enten und des Personals beim Einsatz neuer Techniken zu bewerten. So ist insbesondere zu
21 vermeiden, dass es durch einen unreflektierten Einsatz neuer Techniken und der Verwen-
22 dung nicht optimierter Protokolle zu einem nichtgerechtfertigten Anstieg der Strahlenexposi-
23 tion der Bevölkerung kommt. Aus diesem Grund ist es entscheidend, bereits während der
24 frühen Evaluation neuer diagnostischer Technologien begleitende strahlenhygienische Stu-
25 dien durchzuführen, um die Untersuchungspraxis und die daraus resultierende Strahlenex-
26 position der Patienten zu erfassen. Basierend auf den erhobenen Daten können dann dosis-
27 optimierte Untersuchungsprotokolle erarbeitet und realisiert werden.

28
29 Gegenwärtige Gesundheitsstrategien zielen immer stärker auf Früherkennungsmaßnahmen
30 ab. Hierbei kommt den bildgebenden Verfahren der radiologischen Diagnostik eine besonde-
31 re Bedeutung zu. Während sich das Interesse bislang auf konventionelle Röntgenaufnahmen
32 konzentrierte, wie z.B. die Röntgen-Mammographie, zeichnet sich in einigen Health-Care-
33 Level-I-Ländern der Trend ab, auch dosisintensivere Verfahren, wie z.B. die Röntgen-
34 Computertomographie (CT), einzusetzen. Hintergrund ist, dass moderne CT-Systeme eine
35 räumlich hochaufgelöste Darstellung großer Untersuchungsregionen innerhalb weniger Se-
36 kunden erlauben. So kann z.B. der gesamte Abdomen- oder Thoraxbereich in Atem-Anhal-
37 tetechnik ohne Bewegungsartefakte erfasst werden. Diese neue Technik kann für Vorsorge-
38 untersuchungen eingesetzt werden, z.B. im Dickdarmbereich (virtuelle Koloskopie zur Früh-
39 erkennung von Dickdarmtumoren) bzw. im Herzbereich (Calcium-Scoring, Früherkennung

- 1 arteriosklerotischer Plaques). Diese Entwicklung erfordert die ressortübergreifende Erarbei-
- 2 tung von Konzepten für die Zulassung von radiologischen Untersuchungstechniken als Ver-
- 3 fahren zur Früherkennung gemäß § 25 Abs.1 RöV auf der Basis fundierter Nutzen-Risiko-
- 4 Analysen.

1 **B. Nichtionisierende Strahlung**

2
3 Unter nichtionisierender Strahlung (NIR) versteht man den Bereich des elektromagnetischen
4 Spektrums, in dem die entsprechende Teilchenenergie kleiner als 12,4 eV ist. Diese Grenze
5 entspricht einer Wellenlänge von 100 nm. Sie liegt im Bereich der ultravioletten Strahlung.
6 Definitionsgemäß wird auch der Ultraschall zur nichtionisierenden Strahlung gerechnet.
7 Technische Anwendungen, die nichtionisierende Strahlung nutzen oder bei denen diese
8 Strahlung als Begleitprodukt entsteht, haben unser tägliches Leben, sowohl im Privatbereich
9 als auch am Arbeitsplatz oder in der Medizin, vollständig durchdrungen. So sind alle Anwen-
10 dungsbereiche elektrischer Energie mit niederfrequenten elektrischen und magnetischen
11 Feldern verbunden. Alle drahtlosen Informationsübertragungs- und Kommunikations-
12 verfahren nutzen hochfrequente elektromagnetische Felder oder optische Strahlung. Die
13 optische Strahlung wird darüber hinaus zu Beleuchtungszwecken oder zur Materialbearbei-
14 tung eingesetzt. Ultraviolette Strahlung spielt eine bedeutende Rolle in der Medizin und wird
15 zudem oft für kosmetische Zwecke, z.B. zur Hautbräunung, eingesetzt.

16
17 Im Bereich der nichtionisierenden Strahlung sind Strahlenschutzgrundsätze weit weniger
18 entwickelt als im Bereich der ionisierenden Strahlung. Ein Dosisbegriff existiert nur an-
19 satzweise im Bereich der UV-Strahlung. Vorsorge und Minimierung werden national und in-
20 ternational kontrovers diskutiert.

21 22 **B.I Rechtfertigung**

23 24 *Hintergrund*

25
26 Da Dosis-Wirkungsbeziehungen bislang nicht bekannt sind, beruht die Diskussion auf der
27 plausiblen Annahme, dass eine Reduzierung der Exposition auch zu einer Reduzierung ei-
28 nes möglicherweise bestehenden Risikos führt. Bekannt sind bislang nur akute Wirkungen,
29 die erst oberhalb einer bestimmten Schwellenexposition nachweisbar sind. Für diese Wir-
30 kungen sind auch die entsprechenden Wirkungsmechanismen bekannt. Eine Ausnahme
31 stellt die ultraviolette Strahlung dar; hier sind auch stochastische Wirkungen bekannt. Es
32 besteht wissenschaftlich kein Zweifel, dass ultraviolette Strahlung eine der Hauptursachen
33 für Hautkrebserkrankungen ist. Allerdings sind bisher weder die genauen Mechanismen auf-
34 geklärt, noch ist das Problem der Dosisabschätzung in der Bevölkerung geklärt. Das wesent-
35 liche Problem stellt die unkontrollierte Exposition durch die Sonne dar. Deshalb ist es auch
36 im Bereich der UV-Strahlung bisher nicht gelungen, Risikoeffizienten zu quantifizieren.
37 Auch in diesem Bereich stellen deshalb die akuten Wirkungen die Basis der quantitativen
38 Expositionsbegrenzung dar. Darüber hinaus ist nur eine qualitative Risikoabschätzung mög-
39 lich.

1 Strahlenschutzempfehlungen bei NIR beruhen im Wesentlichen auf der Begrenzung der Ex-
2 position auf Werte, die deutlich unterhalb von Wirkungsschwellen liegen. Auch im UV-BE-
3 reich werden die bekannten Schwellen für akute Wirkungen zugrundegelegt. Der Begriff der
4 Rechtfertigung ist im NIR-Bereich bislang noch nicht diskutiert worden.

5
6 Anders als im Bereich der ionisierenden Strahlung ist die anthropogen bedingte nichtionisie-
7 rende Strahlung mit der zunehmenden Technisierung aller Lebensbereiche verbunden. Die
8 Mehrzahl neuer Entwicklungen beruht auf internationalen Normen und die Verbreitung von
9 Produkten unterliegt internationalem Recht.

12 *These*

- 14 ▪ Die überwiegend gesellschaftliche Frage einer Rechtfertigung von Expositionen in die-
15 sem Bereich kann nur im Konsens gelöst werden. Der Beitrag des Strahlenschutzes ist
16 auf die qualitative Risikoabschätzung begrenzt. Die Frage der Rechtfertigung sollte vor
17 allem bei der Entwicklung neuer Technologien gestellt werden (vgl. B.II)

20 *Begründung*

21
22 Die in diesem Zusammenhang erforderliche Frage der Risikoabschätzung beruht im Bereich
23 der nichtionisierenden Strahlen derzeit überwiegend auf der Kenntnis akuter Wirkungen und
24 Dosis-Wirkungsbeziehungen mit Schwellencharakter. D.h. unterhalb bestimmter Schwellen
25 sind Risiken wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Dabei ist nicht endgültig geklärt, ob keine
26 Risiken bestehen oder ob sie bisher lediglich nicht erkennbar sind. In weiten Teilen des
27 nichtionisierenden Spektrums kann deshalb derzeit keine belastbare quantitative Risikoab-
28 schätzung erfolgen. Selbst eine qualitative Abschätzung ist in Ermangelung möglicher Wir-
29 kungsmechanismen schwierig. Ob unter diesen Voraussetzungen der Strahlenschutz einen
30 essentiellen Beitrag zur Frage der Rechtfertigung leisten kann, ist fraglich.

1 **B.II Neue Technologien**

3 *Hintergrund*

5 Die letzten Jahrzehnte waren geprägt durch eine rasante Technisierung aller Bereiche des
6 Alltags. Es ist vorhersehbar, dass sich diese Entwicklung in Zukunft in zunehmendem Maß
7 fortsetzen wird. Eine Vielzahl der neuen technischen Anwendungen erzeugen dabei nichtio-
8 nisierende Strahlung, zum Teil sogar in erheblichem Umfang. Beispiele sind die modernen
9 drahtlosen Kommunikationstechniken, aber auch die Entwicklung neuer, leistungsstarker
10 Lichtquellen.

12 Eine Strahlenschutzbewertung neuer Technologien ist bisher erst nach Markteinführung der
13 Technologie möglich, da die hierfür erforderlichen Daten dem Strahlenschutz vorher nicht
14 verfügbar gemacht werden. Änderungen technischer Details, die zu einem verbesserten
15 Strahlenschutz führen könnten, sind unter diesen Umständen dann meist nicht mehr reali-
16 sierbar. Als Beispiel aus der Vergangenheit wird auf Schnurlostelefone nach dem DECT-
17 Standard hingewiesen. Die permanente Emission hochfrequenter Felder durch den Kontroll-
18 kanal wäre für Anwendungen im Hausgebrauch nicht erforderlich.

20 Ein aktuelles Beispiel sind Infrarot-Wärmekabinen, die als Ersatz herkömmlicher Saunas
21 ohne Beteiligung des Strahlenschutzes und weitgehend ohne Sachkenntnisse über mögliche
22 gesundheitliche Auswirkungen entwickelt wurden. Sie werden derzeit in großem Stil ver-
23 markt.

25 Prinzipiell lassen sich die offenen Fragen neuer Technologien in zwei Kategorien einteilen:

- 26 1. Frequenzbereiche, bei denen Wirkmechanismen mit Schwellencharakter bekannt sind:
27 Hier besteht die z.T. berechtigte Sorge, dass durch die Summe der stetig steigenden
28 Zahl an Quellen die Schwellenwerte zunehmend ausgeschöpft werden. Es ist nicht aus-
29 zuschließen, dass es durch Interferenzen lokal zu aus Sicht des Strahlenschutzes be-
30 denklichen Expositionserhöhungen kommt.
- 31 2. Neu erschlossene Nischen des elektromagnetischen Spektrums wie z.B. Tera-Hertz
32 (THz)-Strahlung: Bisher gab auf dem Markt nur wenige und kostspielige THz-Quellen. Es
33 könnten sich aber künftig eine Vielzahl von praktischen Anwendungen, von der medizini-
34 schen Diagnostik bis hin zum Kommunikationssystem, ergeben. Mögliche Wirkungen
35 werden bisher aus den Erkenntnissen für den angrenzenden Mikrowellen- und Infrarotbe-
36 reichen extrapoliert, lassen sich jedoch nicht in jedem Fall widerspruchlos erklären. Bis-
37 her mangelt es sowohl an Forschungsvorhaben zur Wirkungsforschung, als auch an
38 Mess- und Rechenverfahren für die Expositionsbestimmung.

1 *Thesen*

2

3 ▪ Nur durch eine frühzeitige Beteiligung des Strahlenschutzes an der Entwicklung neuer
4 Technologien können die Vorgaben eines vorsorgenden Strahlenschutzes (s. auch D.II)
5 an feldemittierende Quellen umgesetzt werden. Es ist eine Expositionsminimierung durch
6 technische Optimierung aller Feldquellen erforderlich. Eine entsprechende Ressortab-
7 stimmung insbesondere mit dem BMBF ist diesbezüglich anzustreben.

8 ▪ Grundlagenforschung zum Strahlenschutz sollte **vor** der Markteinführung neuer Geräte
9 dort erfolgen, wo Kenntnislücken bestehen (z.B. THz-Bereich) oder wo diese wissen-
10 schaftlich begründet zu vermuten sind.

11

12 *Begründung*

13

14 Mögliche gesundheitliche Risiken bei Anwendung neuer Technologien können nur dann
15 frühzeitig erkannt werden, wenn der Strahlenschutz schon in der Entwicklungsphase beteiligt
16 wird. Dies sollte im Interesse aller Beteiligten sein. In Zukunft wird die Glaubwürdigkeit des
17 Strahlenschutzes auch davon abhängen, inwieweit er in der Lage ist, proaktiv auf neue tech-
18 nische Entwicklungen einzuwirken.

B.III Grenzwertsetzung

Hintergrund

In Deutschland fehlt derzeit eine allgemeine Rechtsgrundlage für den Strahlenschutz der Bevölkerung bei nichtionisierender Strahlung. In einzelnen Frequenzbereichen bestehende Regelungen, wie z.B. das Bundesimmissionsschutzgesetz oder funktechnische Gesetze können diese Lücke nicht umfassend schließen. Sie regeln nur einzelne Quellen, wie z.B. Funksendeanlagen mit einer Sendeleistung über 10 W EIRP oder Niederspannungsanlagen bei 16 2/3 Hz und 50 Hz, die mit Spannungen größer 1000 V betrieben werden. Die im Rahmen von europäischen Normen vorliegenden Empfehlungen werden den Anforderungen, die an Strahlenschutzregelungen zu stellen sind, nicht gerecht. So können z.B. nach diesen Normen einzelne Geräte in ihrer Umgebung Immissionen hervorrufen, welche die Grenzwertempfehlungen voll ausschöpfen.

Der Bereich der optischen Strahlung ist vom Strahlenschutz rechtlich überhaupt nicht erfasst. Hier bestehen ausschließlich technische Normen.

Die Folge ist, dass, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eine weitgehend unkontrollierte Exposition der Bevölkerung stattfindet.

Die bestehenden Empfehlungen des Europäischen Rates zum Schutz der Bevölkerung vor elektromagnetischen Feldern können im Einzelfall zur Bewertung herangezogen werden, haben aber keine rechtliche Verbindlichkeit und decken den Bereich der optischen Strahlung nicht ab.

International ist die Situation ähnlich. Es ist kein Land bekannt, das eine umfassende rechtliche Strahlenschutzregelung hätte. In vielen europäischen Ländern bestehen, ähnlich wie in Deutschland, Vorschriften für einzelne Frequenzbereiche. Hier sind vor allem Funkanlagen und Stromversorgungsanlagen zu nennen. In einzelnen Ländern gibt es darüber hinaus gesetzliche Regelungen für bestimmte optische Quellen, wie z.B. Solarien.

Ein weltweiter Vergleich der WHO zeigt, dass viele Länder sich bei ihren meist untergesetzlichen Regelungen (z.B. Normen) an den Empfehlungen der ICNIRP orientieren. Daneben existieren in einigen Ländern des ehemaligen Ostblocks, z.B. in Russland, erheblich niedrigere „Grenzwerte“, deren Rechtsverbindlichkeit aber unklar ist. Sie wurden außerdem in den letzten Jahren mit der Einführung neuer Technologien deutlich angehoben. In den USA orientieren sich die z.B. für Funkanwendungen bestehenden behördlichen Vorschriften an den Empfehlungen von IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), einer amerikanischen Normungsorganisation. Diese Werte sind bezüglich des SAR-Wertes für Handys um etwa den Faktor 2 konservativer als die Europäischen Empfehlungen. Die WHO ist derzeit bemüht, eine Harmonisierung aller internationalen Empfehlungen zum Strahlenschutz zu erreichen.

1 Der Bereich des Arbeitsschutzes ist vergleichsweise gut geregelt. National bestehen eine
2 Vielzahl von Unfallverhütungsvorschriften und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften. Im
3 europäischen Rahmen werden derzeit Arbeitsschutzdirektiven für den gesamten Bereich der
4 nichtionisierenden Strahlung erarbeitet.

5

6 *Thesen*

7

- 8 ▪ Der Schutz der Bevölkerung im Bereich der nichtionisierenden Strahlung kann nur durch
9 rechtsverbindliche Regelungen sichergestellt werden.
- 10 ▪ Die Basisregelungen sollten durch Festlegung von Grenzwerten erfolgen und diese soll-
11 ten international harmonisiert werden.

12

13 *Begründung*

14

15 Die auf Freiwilligkeit beruhenden Empfehlungen finden keine ausreichende Beachtung und
16 werden durch europäische Normen z.T. missachtet. Ein effektiver Schutz der Bevölkerung ist
17 deshalb nur durch rechtsverbindliche Regelungen zu gewährleisten.

18

19 Die Glaubwürdigkeit von Grenzwerten kann nur vermittelt werden, wenn sie international
20 vergleichbar sind. Erhebliche Unterschiede führen automatisch zu einem Vertrauensverlust
21 auch in Bezug auf die zuständigen Institutionen.

1 C. Schutz von Natur und Umwelt

3 Entwicklung von Schutzkonzepten für Flora, Fauna und Umweltmedien

5 *Hintergrund*

7 Vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklungen zum langfristigen Schutz der Bio-
8 sphäre, ausgehend von der Deklaration von Rio 1992 mit ihren Konzepten der Nachhaltigkeit
9 und Erhaltung der Biodiversität, ist in den letzten Jahren verstärkt die Notwendigkeit postu-
10 liert worden, dass Strahlenschutzkonzepte neben dem Schutz des Menschen gleichwertig
11 den Schutz der Umwelt nachweisen müssen. Dies hat in Deutschland mittlerweile beispiels-
12 weise Eingang in die Anforderungen, die an Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) gestellt
13 werden, gefunden.

15 Derzeit werden im Rahmen internationaler Forschungsprojekte entsprechende Schutzziele
16 entwickelt und geeignete Konzepte zur Sicherstellung solcher Schutzziele erarbeitet. Die
17 Diskussionen zur Einbindung des Schutzes der Umwelt in die Strahlenschutz-Regularien
18 haben in der IAEA und der ICRP (im Rahmen einer Task Group) begonnen, sind jedoch
19 noch nicht abgeschlossen.

21 Im Bereich der nichtionisierenden Strahlung besteht durch die Sonne eine natürliche Quelle
22 für ultraviolette Strahlung, die zu einer Exposition der Umwelt in erheblichem Ausmaß führt.
23 Die möglichen Schädigungen der belebten Umwelt, vor allem auch im Zusammenhang mit
24 den anthropogen verursachten Veränderungen in der Atmosphäre sind lange bekannt. Der
25 Schutz der Umwelt in diesem Zusammenhang kann aber vom Strahlenschutz alleine nicht
26 geleistet werden. Hier stehen Fragen der Reinhaltung der Atmosphäre im Vordergrund.

27 In zunehmendem Maße verursachen aber auch großtechnische Anlagen Emissionen im Be-
28 reich der belebten Umwelt, die dort zu negativen Auswirkungen führen könnten. Beispiele
29 sind leistungsstarke HF-Sender zur Untersuchung der Atmosphäre oder Offshore Windkraft-
30 anlagen und die dazugehörigen Seekabel.

32 Die Frage der Auswirkungen elektromagnetischer Emissionen auf die belebte Umwelt sind
33 bislang nicht nur national, sondern auch international stark vernachlässigt worden. Der Ver-
34 such einer systematischen Erfassung des bisherigen Kenntnisstandes wurde bisher nur in
35 einem vom BfS in Zusammenarbeit mit der WHO und ICNIRP durchgeführten internationalen
36 Seminar im Oktober 1999 unternommen. Die wissenschaftlichen Grundlagen zu einer be-
37 lastbaren Bewertung der möglichen Schädigung von Flora und Fauna sind allerdings bislang
38 nicht systematisch erarbeitet.

1 *Thesen*

2

3 ▪ Die internationalen Aktivitäten zur Formulierung geeigneter Schutzziele und Erarbeitung
4 wissenschaftlicher Konzepte zu deren Einhaltung sollten von Deutschland wesentlich
5 mitgestaltet werden.

6 ▪ Dabei ist auf eine Harmonisierung der Schutzziele und Nachweiskonzepte mit denen für
7 andere Noxen zu achten.

8 ▪ Schutzziele und Verfahren sollten auf der Basis einer breiten gesellschaftlichen Diskus-
9 sion festgelegt werden.

10 ▪ Um für vergleichsweise geringe Emissionen nicht zu übermäßig aufwendigen Verfahren
11 zu gelangen, sollte sich die Verfahrenstiefe an den zu erwartenden Emissionen und Im-
12 missionen orientieren – ein Ansatz, der von deutscher Seite verstärkt in die interna-
13 tionalen Diskussionen eingebracht werden sollte. Gleichmaßen sollten international propa-
14 gierte Ansätze nur dann übernommen werden, wenn sie diesem Verhältnismäßigkeits-
15 Kriterium genügen.

16 ▪ Dem Schutz der Umwelt vor nichtionisierender Strahlung ist zukünftig verstärkt Aufmerk-
17 samkeit zu widmen. Durch gezielte Forschung ist zu klären, unter welchen Bedingungen
18 eine Schädigung der Umwelt durch nichtionisierende Strahlung möglich ist. Im Rahmen
19 von Umweltverträglichkeitsprüfungen sollten auch die möglichen Folgen der Immission
20 elektromagnetischer Felder geprüft werden.

21

22 *Begründung*

23 Auch wenn Vieles dafür spricht, dass die in Deutschland existierenden Emissions- und Im-
24 missionsregelungen der derzeitigen Strahlenschutzverordnung, die auf den Schutz des Men-
25 schen fokussiert sind, einen Schutz der Umwelt ebenfalls gewährleisten, sind eigene Rege-
26 lungen erforderlich, um die Einhaltung dieses Schutzziels nachweisen und dokumentieren zu
27 können.

28

29 Eine Harmonisierung von Schutzzielen und Konzepten mit den existierenden Vorgehenswei-
30 sen für andere Noxen, die beispielsweise im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfungen in
31 Deutschland berücksichtigt werden, ist erforderlich, um in Deutschland zu vergleichbaren
32 Ansätzen der Umweltbewertung unterschiedlicher potentiell toxischer Substanzklassen zu
33 kommen. Dafür sind in der Ökotoxikologie seit langem schon wissenschaftliche Prüfverfah-
34 ren entwickelt worden. Diese sollten detailliert für ihre Eignung zum Nachweis des Schutzes
35 der Umwelt vor radioaktiven Substanzen analysiert und bewertet werden – zum einen, um
36 unterschiedliche Vorgehensweisen oder möglicherweise gar differierende Schutzziele für
37 verschiedene Klassen potentiell umwelttoxischer Substanzen ausschließen zu können, zum

1 anderen, um von den langjährigen Erfahrungen der Ökotoxikologie zu profitieren. Hierzu
2 kann auf die umfangreichen Erfahrungen des Umweltbundesamtes und des Bundesamtes
3 für Naturschutz zurückgegriffen werden.

4
5 Eine breite gesellschaftliche Diskussion über die in Deutschland anzustrebenden Schutzziele
6 und Verfahren zu ihrer Umsetzung ist anzustreben, da sich in den letzten Jahren in den in-
7 ternationalen Strahlenschutzgremien zunehmend ein Konsens entwickelt hat, bei neuen
8 Empfehlungen mehr als bisher üblich gesellschaftliche Debatten zu berücksichtigen ("stake-
9 holder involvement"). Nach heutigem Stand ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass we-
10 sentliche Bestandteile der zukünftigen Empfehlungen der Internationalen Strahlen-
11 schutzkommission ICRP zum Schutz der Umwelt – wie beispielsweise die Schutzziele –
12 nicht vorgegeben werden, sondern dass die ICRP erwartet, dass diese als Resultat öffentli-
13 cher Diskussionen in den einzelnen Staaten formuliert werden.

14

1 **D. Über den reinen Strahlenschutz hinausgehende Fragestellungen**

3 **D.I Risikobasierte Bewertungsverfahren**

5 *Hintergrund*

7 Die Abschätzung und Bewertung von Strahlenwirkungen und Strahlenrisiken und die daraus
8 abgeleiteten Strahlenschutzregelungen basieren neben den wissenschaftlichen Erkenntnis-
9 sen über Strahlenwirkungen auf Überlegungen zur gesellschaftlichen Akzeptabilität von
10 Strahlenrisiken. Diskussionen dazu wurden in internationalen und nationalen überwiegend
11 mit Naturwissenschaftlern besetzten Gremien wie ICRP, UNSCEAR, Euratom Artikel 31
12 Gruppe und SSK geführt und flossen in deren Empfehlungen zum Strahlenschutz ein. Diese
13 Empfehlungen, insbesondere die der ICRP, wurden dann subsequent nahezu unverändert in
14 verbindliche internationale und nationale Strahlenschutzregelungen umgesetzt. Vergleich-
15 bare Entwicklungen lassen sich für die nichtionisierende Strahlung, aber auch für andere
16 physikalische, chemische und biologische Noxen aufzeigen.

18 Charakteristisch für diese Vorgehensweisen ist, (i) eine auf naturwissenschaftlichen Kennt-
19 nissen aufbauende Abschätzung von Expositionen und Wirkungen sowie deren Abhängig-
20 keiten, (ii) eine Diskussion zur Akzeptabilität von Risiken in Wissenschaftsgremien, (iii) dar-
21 auf aufbauend die Entwicklung von Regulationsgrundsätzen und -verfahren, die spezialisiert
22 nur auf die betrachtete Noxe anwendbar sind, mit weitgehendem Verlust des Risikobezugs
23 und (iv) eine Kompensation dieses verloren gegangenen Risikobezugs durch argumentati-
24 ven Verweis auf natürliche oder andere Belastungen. Defizite dieser Vorgehensweise sind
25 (a) die weitgehend fehlenden Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilnahme an den Dis-
26 kussionen zur Akzeptabilität von Risiken und daraus folgend bei der Entwicklung von Regu-
27 lationsgrundsätzen und -verfahren, (b) die Nichtvergleichbarkeit der den Regulationen von
28 Einzelnoxen innewohnenden Risikobeiträge für die menschliche Gesundheit, (c) die starke
29 Abhängigkeit der in den Regulationen gesetzten Standards vom derzeitigen Wissen zur Wir-
30 kung der Noxe und damit der Notwendigkeit der häufigen Anpassung an sich veränderndes
31 Wissen und (d) das Fehlen einheitlicher Vorgehensweisen bei der Bewertung von Gesund-
32 heits- und Umweltrisiken durch verschiedene Noxen in einem Umweltmedium.

34 Aus der Charakterisierung der Verfahren und dem Aufzeigen von Defiziten ergibt sich die
35 Notwendigkeit, (α) die Aufgabe der Naturwissenschaften mit der bestmöglichen Expositions-
36 und Wirkungsabschätzung zu definieren, (β) die Bewertung der Risiken, aber auch die Fest-
37 legung von Schutzgütern und Schutzzielen dem gesellschaftlichen Dialog zu öffnen und (γ)
38 einen Bewertungsbezug zu entwickeln, der eine Vergleichbarkeit von Risiken ermöglicht,

1 eine Bewertung komplexer Expositionssituationen erlaubt und eine möglichst hohe Bestän-
2 digkeit aufweist.

3
4 Die heute regulationsrelevanten Expositionen in Um- und Arbeitswelt sind in der Regel cha-
5 rakterisiert durch Expositionen gegenüber bekannten Einzelnoxen auf relativ niedrigem Ni-
6 veau. Relevant ist in Folge dessen zunehmend weniger die Regulation der Einzelnoxen, als
7 vielmehr die Gesamtbelastung in Luft, Wasser etc.. Andererseits sind wir heute konfrontiert
8 mit einer breiten Einführung neuer Belastungen, ohne dass eine abschließende Abschätzung
9 und Bewertung der Risiken möglich war (z.B. Mobilfunk). Auch durch die anstehenden Frei-
10 gaben im Zusammenhang mit der Stilllegung und dem Abriss kerntechnischer Anlagen und
11 Reaktoren stellen sich erneut Fragen der Abwägung zwischen individuellen Risiken und dem
12 Gesamtrisiko. Durch diese Veränderung der Abschätz- und Bewertungsfragen von Einzelno-
13 xen mit bekanntem Wirkspektrum zu komplexen Expositionen mit jeweils kleinen Expositi-
14 onsbeiträgen einzelner Stoffe bzw. der Einführung von Expositionen mit neu zu bewertenden
15 adversen Wirkungen wird die Entwicklung und Einführung eines konsistenten Bewertungs-
16 bezugs zunehmend notwendiger.

17 18 *Thesen*

- 19
- 20 ▪ Der wissenschaftliche Prozess der Abschätzung von Strahlenrisiken bedarf eines ein-
21 deutigen und nachvollziehbaren Verfahrens mit einem hohen Maß an Transparenz und
22 einer Umweltmedien (u.a. Wasser, Boden, Luft) sowie Regulationskontexte (u.a. beruflich
23 strahlenexponierte Personen, Bevölkerung, Trinkwasser, Lebensmittel) übergreifenden
24 Konsistenz. Eine pluralistische Beteiligung der Fachöffentlichkeit ist bei komplexen oder
25 wissenschaftlich strittigen Themen notwendig und im Verfahren zu verankern. Bei gesell-
26 schaftlich kontroversen Themen sollte in besonderen Fällen bereits in der Phase der Ri-
27 sikoabschätzung auch betroffenen und organisierten gesellschaftlichen Gruppen eine
28 Beteiligung durch eigene Fachvertreter ermöglicht werden.
 - 29 ▪ Normative Vorgaben, die nicht ausschließlich durch Naturwissenschaftler vorgenommen
30 werden können und sollten, müssen zu Beginn der Risikoabschätzung in einem legiti-
31 mierten Verfahren festgelegt werden. Hierzu gehören u.a. die Fragen von (tolerablen,
32 unbedenklichen, etc.) Risikoniveaus, der Festlegung der Adversität und der Auslegung
33 der Vorsorge. Eine angemessene Beteiligung der Betroffenen und gesellschaftlicher
34 Gruppen ist zu ermöglichen. Diese Beteiligung ist sachlich, rechtsstaatlich und demokra-
35 tisch geboten, da die Definition von Schutzziel und Schutzniveau und die Festlegung von
36 Konventionen bei der Risikobewertung von gesellschaftlichen und politischen Zielsetzun-
37 gen bestimmt werden.
 - 38 ▪ Ein risikobasiertes Bewertungsverfahren legt die gesellschaftliche Rahmensetzung für
39 die Risikobewertung fest und bestimmt den Bewertungsrahmen, der dann weiter auf ver-

1 schiedenen Fachebenen ausgefüllt werden kann. Eine risikobasierte Bewertung ist weit-
2 gehend unabhängig vom aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnistand, d.h. Verän-
3 derungen der Erkenntnis bedingen zwar eine Veränderung der Dosis-Wirkungs-Bezie-
4 hung, aber nicht notwendig des als hinnehmbar, akzeptabel charakterisierten Risikoniv-
5 veaus. Eine vergleichende Risikobewertung wird durch eine risikobasierte Bewertung
6 ermöglicht. Das risikobasierte Bewertungsverfahren definiert das Risiko, das die Gesell-
7 schaft bereit ist, als Konsequenz ihres Handelns selbst hinzunehmen und unbeteiligten
8 Dritten zuzumuten.

- 9 ▪ Die Begründung akzeptabler Risikoniveaus verursacht durch zusätzliche Expositionen
10 aus menschlichen Aktivitäten mit dem Vorliegen natürlicher Strahlenbelastungen ist e-
11 thisch problematisch. In der ethischen Diskussion ist diese Problematik als naturalisti-
12 scher Fehlschluss beschrieben, d.h. der unzulässigen Ableitung ethischer Schlussfolge-
13 rungen aus wissenschaftlichen Fakten.
- 14 ▪ Als anzustrebendes bzw. zu unterschreitendes Risikoniveau hat sich in der internationa-
15 len Diskussion für schwerwiegende Erkrankungen der Bereich zwischen 1 in 1.000.000
16 und 1 in 10.000 pro Lebenszeit herausgebildet. Dabei gilt allgemein, dass der überwie-
17 gende Teil der exponierten bzw. potentiell exponierten Bevölkerung auf dem Niveau von
18 1 in 1.000.000 zu schützen ist. Ist dieses Risikoziel für alle Individuen nicht zu erreichen,
19 so ist ein Abweichen für die am höchsten exponierten Personen bis zu einer Risiko-
20 schranke von 1 in 10.000 zulässig, wenn auf der Basis des Minimierungsgrundsatzes
21 niedrigere Risiken nicht erzielt werden können.

25 *Begründung*

26
27 Der oben aufgeführte Sachstand und die Position reflektieren in wesentlichen Teilen Arbeiten
28 der Risikokommission zur Risikoabschätzung, -bewertung sowie Kommunikation und Beteili-
29 gung. An den Arbeiten der von BMU und BMGS eingesetzten Kommission war das BfS we-
30 sentlich beteiligt. Eine Projektgruppe des BfS zur Entwicklung von Grundsätzen zur sicheren
31 Endlagerung radioaktiver Abfälle hat sich wesentliche Empfehlungen zu eigen gemacht und
32 in dem Entwurf der Grundsätze konkretisiert. Es wird explizit eine risikobasierte Bewertungs-
33 skala als Entscheidungsrahmen zur Festlegung der Standortsuch-, der Sicherheits- und der
34 Strahlenschutzkriterien empfohlen. Hervorzuhebende Gründe hierfür waren die Unabhängig-
35 keit der Bewertungsskala vom aktuellen Wissensstand zu Strahlenrisiken und die Möglichkeit
36 der vergleichenden Risikobewertung. Dieses Verfahren vermeidet die ausschließliche Nut-
37 zung der Monetarisierung von Risiken im Abwägungsprozess von Nutzen und Risiken von
38 Regulations- oder anderen Handlungsmaßnahmen.

1 Die Abschätzung und Bewertung beruht einerseits auf der Evidenz und Plausibilität der wis-
2 senschaftlichen Daten, die eine Gefährdung belegen, andererseits auf der Wahrnehmung des
3 Risikos. Die Wahrnehmung wiederum wird von Faktoren geprägt wie Kontrollierbarkeit, Zu-
4 ordenbarkeit der Verursachung, Verantwortlichkeit etc.. Daraus wird deutlich, dass die Be-
5 wertung von Risiken vielen Einflussfaktoren unterliegt, nicht nur auf wissenschaftlichen Fak-
6 ten beruht und damit abschließend nicht von wissenschaftlichen Gremien durchgeführt wer-
7 den kann.

8
9 Aus diesem Verständnis ist es notwendig, dass vor der Abschätzung und Bewertung von
10 Risiken die Rahmenbedingungen der Risikobewertung in einem gesellschaftlichen Diskurs
11 geklärt werden. Zu den Rahmenbedingungen der Risikobewertung gehören:

12
13 1. Die Festlegung des Schutzgutes und des Schutzziels.

14 Es ist die Frage zu klären, wer oder was soll durch eine Maßnahme geschützt werden. Ist die
15 Allgemeinheit oder ist der Einzelne zu schützen? Was soll das Ziel der Maßnahme sein? Soll
16 ein absoluter Schutz gewährleistet werden, soll eine Gefahr abgewehrt oder im Sinne der
17 Vorsorge gehandelt werden? Die Festlegung des Schutzgutes und des Schutzziels be-
18 schreiben die qualitativen Rahmenbedingungen der Risikobewertung.

19
20 2. Die Festlegung des Schutzniveaus.

21 Das angestrebte Schutzniveau beantwortet die Frage, was als hinreichend sicher angesehen
22 wird. In diesem Zusammenhang sind auch die Fragen der Sicherheit der Risikoaussage und
23 der grundsätzlichen Herangehensweise zu beantworten, d.h. ob im Sinne der Gefahrenab-
24 wehr, der Vorsorge, ob mit ungünstigen oder realistischen Annahmen gearbeitet werden soll.
25 Im Zusammenhang mit Gefahrenabwehr ist häufig der Nachweis der Sicherheit notwendig,
26 bei dem mit ungünstigen, überschätzenden und schnell durchzuführenden Verfahren gear-
27 beitet werden kann. Im Vorsorgebereich, d.h. in Expositionsbereichen bei denen keine akute
28 Gefährdung zu gewärtigen ist, stehen Fragen der Optimierung/Minimierung bzw. Vermei-
29 dung von Expositionen im Vordergrund. Bei diesen Fragestellungen ist eine möglichst realis-
30 tische Abschätzung notwendig. Optimierungs- bzw. Minimierungsverfahren auf der Basis
31 überschätzender Annahmen führen zu in der Regel zu falschen Entscheidungen.

32
33 Festlegungen zum Risikoniveau und zur notwendigen Sicherheit der Abschätzergebnisse
34 bauen zwar auf naturwissenschaftlichen Fakten auf, sind letztlich aber als eine gesellschaf-
35 tliche Aufgabe zu verstehen und entsprechend zu realisieren. Hierzu gehören auch Aussa-
36 gen, was unter einem vernachlässigbaren, unbedenklichen, hinnehmbaren, tolerierbaren
37 Risiko zu verstehen ist.

38

1 Die Argumentation, dass bestimmte niedrige Strahlenexpositionen hinnehmbar seien, weil
2 sie niedrig seien und nur einen Bruchteil der natürlichen Strahlenbelastung ausmachen, be-
3 ruht auf dem aus der ethischen Diskussion bekannten naturalistischen Fehlschluss, indem
4 sie ethische Schlussfolgerungen („hinnehmbar“) aus wissenschaftlichen Fakten ableitet. Eth-
5 ische Folgerungen sind ethisch aus moralischen Werten zu begründen und können nicht aus
6 naturwissenschaftlichen Fakten oder natürlichen Gegebenheiten gefolgert werden. Natürli-
7 che Risiken sind zwar häufig schwierig zu reduzieren, aber aus dieser Tatsache den Schluss
8 zu ziehen, dass zusätzliche Risiken der gleichen Größenordnung oder geringerer Höhe des-
9 wegen zu akzeptieren seien, ist ethisch und logisch nicht zu begründen.

1 **D.II Vorsorge**

3 *Hintergrund*

5 Der verantwortungsvolle Umgang mit Risiken setzt ganz allgemein voraus, dass neben die
6 Abwehr von Gefahren durch das Ergreifen von Schutzmaßnahmen das Prinzip der Vorsorge
7 als eigenständige Maßnahme tritt. Im Bereich niedriger Expositionen wie sie im Leben eines
8 jeden allgegenwärtig sind, herrschen große Unsicherheiten über die tatsächlichen Risiko-
9 faktoren. Im Bereich der ionisierenden Strahlung sind die Unsicherheiten dadurch bedingt,
10 dass die Risikofaktoren durch Extrapolation von belastbaren Daten bei wesentlich höheren
11 Werten gewonnen werden müssen. Die Annahme einer linearen Dosis-Wirkungs-Beziehung
12 bis hinab zu verschwindend kleinen Dosiswerten (sog. LNT-Hypothese) begründet die Not-
13 wendigkeit für die Anwendung des Vorsorgeprinzips (s. auch A.I.3, Optimierung). Trotz aller
14 Anstrengungen in der Forschung kann nicht erwartet werden, dass die bestehenden Unsi-
15 cherheiten jemals ganz ausgeräumt werden können. Im Bereich der nichtionisierenden
16 Strahlung gilt zwar ein durch eine Wirkungsschwelle charakterisiertes Schadenseintrittskon-
17 zept. Aber auch hier gibt es Hinweise auf biologische Effekte unterhalb dieser Schwellen,
18 deren gesundheitliche Relevanz derzeit noch nicht abschließend beurteilt werden kann.

19
20 Zwar sind die Energien nichtionisierender hochfrequenter elektromagnetischer Felder zu
21 niedrig, um zur Krebsinduktion beizutragen. Es werden aber in der wissenschaftlichen Dis-
22 kussion Mechanismen zur Krebspromotion diskutiert. Aus diesem Grund ist auch hier Vor-
23 sorge angezeigt, insbesondere bei Jugendlichen und Heranwachsenden, bei denen eine
24 besondere Strahlenempfindlichkeit bisher nicht ausgeschlossen werden kann.

25 Im Bereich UV ist die Vorsorge insbesondere im Kindesalter und bei heranwachsenden
26 Jugendlichen angezeigt, da in diesem Alterszeitraum ein erheblicher Anteil des Gesamtris-
27 kos, an Hautkrebs zu erkranken, akkumuliert wird.

29 *Thesen*

- 31 ▪ Die Vorsorge stellt beim Umgang mit Risiken neben der Gefahrenabwehr ein zweites
32 wichtiges Prinzip dar, das dem Erhalt der Gesundheit dient und deshalb in den einschlä-
33 gigen rechtlichen Regelungen als Strahlenschutzprinzip verankert werden sollte.
- 34 ▪ Es sollten für Kinder und Jugendliche Vorsorgeprogramme gegen die Risiken der UV
35 Strahlung der Sonne aufgelegt und umgesetzt werden, die Bewusstsein über die Risiken
36 des UV erzeugen und Anleitungen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit deren Ri-
37 siken bei unkontrolliertem Sonnenbaden geben.

1 *Begründung*

2

3 Die im Bereich ionisierender Strahlung und in der Gesundheitspolitik allgemein anerkannte
4 Notwendigkeit der Vorsorge ist im Bereich der nichtionisierenden Strahlung bisher noch nicht
5 in das Bewusstsein der Bevölkerung gelangt; dies gilt es bei der ohnehin überfälligen Rege-
6 lung zum Schutze gegen die Gefahren nichtionisierender Strahlung zu ändern.

7 Trotz beobachteter Zunahme der Zahlen der Hautkrebsinzidenz und entsprechender Emp-
8 fehlungen aus der Wissenschaft mangelt es nach wie vor an Initiativen behördlicherseits, die
9 sich dieser nicht einfach zu lösenden Problematik annehmen.

10